

**UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE
BAHN DES SIEBENTEN SATURNSTRABANTEN
HYPERION.**

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE

GENEHMIGT

VON DER PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT

DER

**FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT
ZU BERLIN.**

VON

RICHARD PRAGER
AUS HANNOVER.



Tag der Promotion: 28. Dezember 1908.

Referenten:

Professor Dr. Struve.

Professor Dr. Bauschinger.

Meiner Mutter

Einleitung.

Der siebente Saturnstrabant Hyperion, in der Zeitfolge der Entdeckungen der achte, wurde im September 1848 nahezu gleichzeitig von Bond in Cambridge und Lassell in Liverpool aufgefunden. Die während dieser Opposition angestellten Beobachtungen ließen sich befriedigend durch eine auffallend exzentrische Ellipse darstellen, ebenso eine von Lassell während der Opposition 1852—53 auf Malta erhaltene Beobachtungsreihe. Dann blieb der Trabant fast unbeobachtet, bis im Jahre 1874 in Washington am 26-Zöller fortdauernde Beobachtungen begonnen wurden. Schon nach wenigen Jahren fand Asaph Hall aus der Vergleichung dieser Beobachtungen mit den Lassellschen des Jahres 1848, daß die Länge des Perisaturniums eine schnelle retrograde Bewegung ausführe¹⁾. Die Ursache dieser Erscheinung erkannte er in den beträchtlichen Störungen, welche Hyperion durch Titan infolge des nahe kommensurablen Verhältnisses der mittleren Bewegungen von Hyperion und Titan erleiden muß. Newcomb²⁾, und unabhängig von ihm Marth³⁾ fanden dann, daß die Änderung der Länge des Perisaturniums von Hyperion mit dem Betrag übereinstimmt, um den die Konjunktionslinie der beiden Trabanten rückwärts schreitet. Newcomb⁴⁾ zeigte, daß die Konjunktionen von Hyperion und Titan stets nahe bei dem Aposaturnium Hyperions stattfinden müssen, daß also eine Libration besteht, infolge deren der Winkel $V = 4l - 3l' - II$ für alle Zeiten um den Mittelwert 180° herum oszilliert. Zugleich leitete Newcomb die hauptsächlichsten Störungen ab, welche von der Exzentrizität Titans und dem von den Apsidenlinien der beiden Trabanten eingeschlossenen Winkel $II - II'$ herrühren.

Aus weiteren Beobachtungen gelang es nun Professor Hermann Struve⁵⁾, die Existenz einer Libration kurzer Periode (etwa 640 Tage) nachzuweisen, deren Einfluß sich auf die Längen, die mittlere Bewegung, die große Halbachse und die Exzentrizität erstreckt. Erst mit Berücksichtigung dieser Libration, deren Amplitude mehr als 36° beträgt, ist es

¹⁾ Astr. Nachr. 2246; Monthly Notices 39, 517.

²⁾ On the motion of Hyperion. Astronomical Papers Vol. III,

³⁾ Monthly Notices 44, 463.

⁴⁾ L. c.

⁵⁾ Astr. Nachr. 3060.

möglich geworden, den Beobachtungen in leidlich befriedigender Weise mit der Rechnung zu folgen. Von einer strengen Theorie ist man aber auch heute noch recht weit entfernt, sowohl der angeführten Schwierigkeiten wegen, als auch besonders, weil infolge der großen Nähe des Halbachsenverhältnisses $\frac{a'}{a}$ zur Einheit die Entwicklungskoeffizienten der Störungsfunktion ihrer Berechnung unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenzusetzen. Es ist daher vorläufig am zweckmäßigsten, zur Verbesserung der Elemente und Ungleichheiten neue Beobachtungen zu benutzen.

Die besten zur Verfügung stehenden Daten hat Struve im wesentlichen aus den von ihm selbst angestellten Beobachtungen am 30-zölligen Pulkowaer Refraktor abgeleitet¹⁾. Zu einer genaueren Bestimmung der Konstanten und der Ungleichheiten mußten, da diese Beobachtungen nur einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum umfassen, die vorhandenen älteren Beobachtungsreihen hinzugezogen werden. Diese stehen an Güte aber den Pulkowaer Beobachtungen erheblich nach, und es erscheint daher auch aus diesem Grunde wünschenswert, auf Grund der später stattgefundenen Beobachtungen, welche zunächst eine höhere Genauigkeit als die älteren erwarten lassen, eine Kontrolle der Struveschen Bahnelemente von Hyperion sowie eine Verbesserung der von ihm abgeleiteten Konstanten vorzunehmen. Das ist im folgenden geschehen, und zwar auf Anregung von Herrn Professor H. Struve, der mich auch bei der Ausführung der Arbeit vielfach mit wertvollen Ratschlägen unterstützt hat, wofür ich ihm meinen besten Dank ausspreche.

A. Die Beobachtungen.

Für den vorliegenden Zweck sind vereinzelte Beobachtungen, wie sie sich in den einschlägigen Publikationen häufig finden, nicht geeignet, und es wurden daher nur diejenigen Reihen berücksichtigt, welche in einem kurzen Zeitraum viele Beobachtungen liefern.

Sämtliche Beobachtungen legen den Ort des Trabanten nach Positionswinkel und Distanz fest, und zwar ist, mit Ausnahme einer Reihe, Hyperion stets an einen anderen Trabanten angeschlossen worden. Die Vorteile dieses Verfahrens sind durch Struve mit Evidenz dargelegt worden. Es geht zwar die Unsicherheit der Position des Anschlußtrabanten in die Rechnung ein, dafür erreichen die Beobachtungen einen Genauigkeitsgrad, der diesen Nachteil bei weitem aufwiegt. Im allgemeinen ist freilich die Genauigkeit aller Beobachtungen keine sehr große, wie aus der unten folgenden Vergleichung der beobachteten und berechneten Örter hervorgehen wird.

¹⁾ Publications de l'Observatoire Central Nicolas, Série II, Vol. XI. Da auf dieses Werk im folgenden öfter zurückgegriffen werden wird, soll es zur Abkürzung mit »Str.« bezeichnet werden.

Direkte Anschlüsse von Hyperion an Saturn finden sich nur in einer von Hussey auf der Lick-Sternwarte erhaltenen Reihe. Der Anschluß wurde hier in der Weise hergestellt, daß die Planetenscheibe mit dem Mikrometerfaden biseziert wurde, weil Messungen an den Rändern wegen der weiten Öffnung der Ringe unmöglich waren. Der Beobachter schätzte die Mitte des Planeten teils nach dem sichtbaren Teil der Scheibe, teils nach der Figur, die von den inneren Ecken des Ringes und dem Planetenrande gebildet wurde. Ob auf die Phase Rücksicht genommen wurde, ist nicht angegeben. Die Refraktion ist bei sämtlichen Beobachtungen vor der Publikation berücksichtigt, so daß nur die Lichtzeit und die Reduktion auf dasselbe Zeitmoment angebracht werden mußten, um das Beobachtungsmaterial gebrauchsfertig zu machen.

Prof. Struve hat Astr. Nachr. 3885 – 86 darauf aufmerksam gemacht, daß der bei der Reduktion der Messungen der inneren Trabanten anzuwendende Schraubenwert des 36-Zöllers einer negativen Korrektur bedarf. Da es sich bei Hyperion aber im allgemeinen um große Distanzen handelt, wobei die Fehler der Einstellung — die auf den Schraubenwert geworfen werden müssen — nicht mehr so merklich hervortreten und der Schraubenwert durch eine Anzahl anderer Messungen mit großer Sicherheit bestimmt ist, wurde für die vorliegenden Beobachtungen der ursprüngliche Wert beibehalten.

Die Ablesung des Positionskreises bei den Beobachtungen auf der Lick-Sternwarte ist mit einer Genauigkeit von 0.05 ausgeführt, der Nullpunkt wurde an jedem Abend mindestens einmal bestimmt. Die Beobachtungen am 26-Zöller in Washington sind mit großer Sorgfalt gemacht. Ein Vorzug vor den Lick-Beobachtungen liegt darin, daß das Mikrometer im allgemeinen nicht vom Fernrohr entfernt wurde, was auf der Lick-Sternwarte geschehen mußte, da gleichzeitig spektroskopische Arbeiten am Instrument unternommen wurden. Auch hier wurde der Parallel in jeder Nacht bestimmt. Beobachtet wurde, soweit Angaben darüber vorliegen, mit hellen Fäden auf dunklem Grunde, da selbst für diese mächtigen Instrumente Hyperion ein besonders schwieriges Objekt bleibt. Die Zahl der Einstellungen in jeder Koordinate ist in der Zusammenstellung der benutzten Beobachtungen, die ich hier folgen lasse, angegeben.

I. Hyperion — Saturn 1901.

	1901	M. Zt. Mt. Hamilton			<i>p</i>	M. Zt. Mt. Hamilton			<i>s</i>
			^h	^m	^s	^o	^h	^m	^s
1	July	13	11	42	4	4.97	11	52	9
2		18	12	7	11	97.86	12	12	58
3		19	11	33	33	106.99	11	39	13
4	August	1	10	33	11	307.90	10	38	19
5		8	10	16	57	95.68	10	21	53
6		15	8	32	30	247.59	8	38	49
7	September	4	8	33	59	225.85	8	38	56
8		13	7	34	29	315.60	7	41	2

Beobachter: Hussey am 36-Zöller des Lick-Obs. (s. Lick Observatory Bulletin Nr. 17 und 34), *p* aus 3, *s* aus 4 Einstellungen.

II. Hyperion — Titan 1901.

	1901	M. Zt. Mt. Hamilton	<i>p</i>	M. Zt. Mt. Hamilton	<i>s</i>
		^h ^m ^s	[°]	^h ^m ^s	["]
1	Juli 13	11 30 11	295.05	11 34 40	87.49
2	18	11 49 4	61.79	11 57 39	100.37
3	19	11 20 1	77.96	11 27 40	133.15
4	26	10 21 22	220.86	10 27 9	132.18
5	August 15	8 43 20	253.01	8 49 33	308.98
6	September 4	8 42 11	268.45	8 46 2	180.67
7	13	7 45 58	290.86	7 49 53	55.49
8	18	7 52 32	1.41	7 56 47	57.31

Beobachter: Hussey am 36-Zöller des Lick-Obs. (s. Lick Observatory Bulletin Nr. 17 und 34). *p* aus 3, *s* aus 4 Einstellungen.

III. Hyperion — Titan 1901.

	1901	M. Zt. Washington	<i>p</i>	M. Zt. Washington	<i>s</i>
		^h ^m	[°]	^h ^m	["]
1	April 28	15 41.0	249.65	15 40.6	118.74
2	29	15 3.1	261.75	15 4.0	141.95
3	Mai 13	14 58.2	330.76	14 58.5	75.38
4	14	15 20.7	10.29	15 20.5	67.45
5	15	14 59.2	48.77	14 59.4	87.06
6	23	14 49.8	201.93	14 49.4	112.65
7	Juni 9	13 40.5	137.72	13 40.2	220.53
8	10	13 31.9	175.89	13 32.5	164.27
9	18	13 9.0	305.51	13 4.5	255.75
10	24	12 26.9	91.08	12 26.5	263.04
11	27	12 20.1	124.33	12 20.0	157.18
12	Juli 5	11 37.6	285.19	11 37.5	141.06
13	9	11 14.7	300.37	11 14.7	48.09
14	10	10 34.1	293.47	10 34.5	48.46
15	15	10 44.6	317.42	10 44.7	78.87
16	20	10 33.1	101.61	10 33.0	147.22
17	21	10 30.3	97.23	10 30.6	170.19
18	23	10 27.0	119.14	10 28.1	151.80
19	August 7	10 17.4	80.15	10 17.2	330.15
20	8	10 46.0	90.69	10 46.2	372.85
21	9	9 58.6	99.70	9 58.8	375.28
22	19	9 40.2	287.56	9 40.2	362.52
23	20	9 8.8	297.16	9 10.5	303.36
24	21	9 17.7	312.57	9 17.4	229.37
25	22	10 1.9	340.00	10 1.5	161.49
26	September 3	8 45.1	257.92	8 45.0	165.50
27	4	8 58.2	267.43	8 58.1	180.05
28	6	9 1.0	281.19	9 1.0	159.42
29	7	8 36.5	288.03	8 36.5	131.94
30	8	7 31.0	294.69	7 32.5	103.73
31	9	8 44.0	301.94	8 44.0	73.01
32	12	7 14.6	296.04	7 14.7	42.19

Beobachter: See am 26-Zöller des U. S. Naval Observatory, Washington (s. Astr. Nachr. Bd. 159, Nr. 3806). *p* aus 10, *s* aus 10 Einstellungen.

Die Beobachtung von Juli 20 mußte ausgeschlossen werden, da die Vergleichen ergab, daß hier offenbar eine Verwechslung des Objektes vorgekommen sein muß.

IV. Hyperion — Titan 1902.

	1902	M. Zt. Mt. Hamilton	p	M. Zt. Mt. Hamilton	s
1	Juni 14	^h 14 ^m 5 ^s 59	267.05	^h 14 ^m 10 ^s 38	367.28
2	August 6	10 5 33	65.42	10 9 8	143.12
3	6	11 28 31	66.60	11 31 10	145.42
4	14	9 38 12	221.36	9 46 5	161.67
5	14	9 55 52	221.85	10 0 16	161.60
6	September 3	8 33 14	255.47	8 46 58	293.91
7	4	8 56 37	265.28	9 2 22	339.93
8	17	7 23 53	115.81	7 27 57	121.88
9	Oktober 1	7 39 55	269.16	7 43 52	124.17
10	2	7 40 4	274.77	7 45 26	150.04

Beobachter: Hussey am 36-Zöller des Lick-Obs. (s. Lick Observatory Bulletin Nr. 34).
 p aus 3, s aus 4 Einstellungen.

Die Beobachtungen von September 4 und September 17 legten die Vermutung nahe, daß sie durch Druckfehler entstellt seien. Denn eine Verbesserung des Positionswinkels in September 4 von 275.28 in 265.28 und der Distanz in September 17 von 221.88 in 121.88 lieferte eine innerhalb der gewöhnlichen Grenzen befriedigende Übereinstimmung zwischen dem gerechneten und beobachteten Ort. Diese verbesserten Werte wurden daher der weiteren Rechnung zugrunde gelegt.

V. Hyperion — Rhea 1902.

	1902	M. Zt. Mt. Hamilton	p	M. Zt. Mt. Hamilton	s
1	Juni 14	^h 13 ^m 51 ^s 36	272.03	^h 13 ^m 57 ^s 36	165.26
2	August 6	10 13 11	85.42	10 16 0	190.45
3	21	9 46 2	330.39	9 49 3	81.92
4	28	9 5 45	96.71	9 10 11	127.86
5	September 3	9 4 49	217.25	9 8 52	78.04
6	4	8 43 40	234.10	8 48 34	137.45
7	17	8 24 19	92.43	8 27 42	263.85
8	Oktober 1	8 17 3	289.58	8 20 45	129.38
9	2	8 27 38	288.74	8 32 38	179.60

Beobachter: Hussey am 36-Zöller des Lick-Obs. (s. Lick Observatory Bulletin Nr. 34).
 p aus 3, s aus 4 Einstellungen.

VI. Hyperion — Tethys 1903.

	1903	M. Zt. Washington	p	M. Zt. Washington	s
1	September 13	^h 9 ^m 21 ^s 36	92.76	^h 9 ^m 21 ^s 33	167.67
2	14	8 25 20	92.86	8 25 15	224.45
3	15	8 32 11	107.77	8 31 31	172.22
4	22	8 11 36	240.36	8 10 50	129.00
5	25	7 47 10	275.20	7 47 20	257.71
6	26	7 50 34	273.28	7 50 28	212.81

Beobachter: Frederick am 26-Zöller des U. S. Naval Observatory, Washington (s. Astr. Journal Bd. 24, Nr. 559). p aus 8, s aus 8 Einstellungen.

VII. Hyperion — Titan 1903.

	1903	M. Zt. Washington	<i>p</i>	M. Zt. Washington	<i>s</i>
		^h ^m ^s	^o	^h ^m ^s	["]
1	Juli 24	13 28 45	289.35	13 40 7	290.60
2	August 17	11 54 7	273.85	11 57 37	124.08
3	September 11	10 19 30	53.92	10 18 0	180.76
4	12	9 37 35	75.38	9 37 20	269.00
5	13	9 5 55	86.64	9 6 0	341.68
6	14	8 48 8	94.57	8 47 58	380.16
7	15	8 52 7	102.06	8 52 25	375.00
8	21	8 18 46	253.88	8 19 6	274.22
9	22	8 39 30	263.95	8 39 0	333.23
10	25	8 15 45	282.96	8 15 58	326.67
11	Oktober 13	7 28 40	268.74	7 28 40	81.58
12	14	7 19 27	268.02	7 19 54	64.68
13	18	7 5 0	261.86	7 6 26	81.22
14	20	6 45 26	272.73	6 44 19	130.13
15	21	7 0 48	278.46	7 1 0	144.94

Beobachter: Frederick am 26-Zöller des U. S. Naval Observatory, Washington (s. Astr. Journal Bd. 24, Nr. 559). *p* aus 8, *s* aus 8 Einstellungen.

VIII. Hyperion — Titan 1904.

	1904	M. Zt. Mt. Hamilton	<i>p</i>	M. Zt. Mt. Hamilton	<i>s</i>
		^h ^m ^s	^o	^h ^m ^s	["]
1	September 10	10 50 12	79.01	10 52 48	122.04
2	11	10 36 47	82.01	10 40 59	184.09
3	16	10 13 48	117.00	10 19 31	221.18
4	17	8 50 5	133.78	8 54 41	158.65
5	27	7 26 5	329.76	7 34 3	131.62
6	29	7 48 57	71.89	7 55 47	220.99
7	Oktober 1	10 7 27	92.68	10 13 34	377.76
8	13	7 16 7	283.79	7 20 11	258.49
9	20	7 8 8	94.24	7 12 47	186.30
10	23	7 22 17	116.99	7 26 30	104.11
11	27	6 46 13	242.29	6 50 55	52.07
12	27	7 50 29	243.52	7 54 20	52.06
13	November 3	6 53 22	240.78	6 58 0	50.25
14	10	6 34 14	301.14	6 41 7	100.63
15	11	6 58 55	334.35	7 4 35	59.40
16	17	6 47 45	102.69	6 57 45	249.91
17	Dezember 2	6 9 3	76.63	6 13 21	220.58

Beobachter: Hussey am 36-Zöller des Lick-Obs. (s. Lick Observatory Bulletin Nr. 68). *p* aus 4, *s* aus 6 Einstellungen.

Die Beobachtung September 10 wurde wegen offener Verwechslung des Objektes ausgeschlossen.

IX. Hyperion — Titan 1904.

	1904	M. Zt. Washington	<i>p</i>	M. Zt. Washington	<i>s</i>
1	August 12	12 ^h 3 ^m 41 ^s	296.20	12 ^h 4 ^m 31 ^s	154.87
2	September 2	9 57 58	259.75	9 58 51	117.88
3	10	8 49 40	62.62	8 50 46	104.81
4	11	8 34 36	80.19	8 35 18	169.73
5	16	10 33 49	115.64	10 34 29	229.18
6	30	8 29 58	83.69	8 30 45	307.25
7	Oktober 1	8 9 54	91.29	8 9 50	370.37
8	3	7 45 5	103.19	7 47 5	365.41
9	4	8 39 39	111.29	8 39 40	297.77
10	5	7 34 16	124.06	7 34 52	212.78
11	6	7 23 17	154.26	7 24 53	129.45
12	7	8 0 48	213.76	8 0 50	121.29
13	10	7 38 33	266.99	7 38 19	303.60

Beobachter: Hammond am 26-Zöller des U. S. Naval Observatory, Washington (s. Astr. Nachr. Bd. 168, Nr. 4026). *p* aus 8, *s* aus 8 Einstellungen.

B. Vergleichung zwischen Beobachtung und Rechnung.

Die Berechnung der zur Verbesserung der Elemente notwendigen Differentialquotienten gestaltet sich bei Verbindungen der Satelliten untereinander am einfachsten für rechtwinklige Koordinaten. Diese wurden für sämtliche Rechnungen benutzt, und zwar wurde ein Achsenkreuz zugrunde gelegt, dessen *Y*-Achse nach dem Pole der Bahnebene des Trabanten gerichtet ist, und dessen *X*-Achse senkrecht zu ihr verläuft. Der Winkel, den die *Y*-Achse so mit der Nordrichtung bildet, soll im folgenden mit *P* bezeichnet werden. In den Fällen, wo der Anschluß von Hyperion nicht an Saturn, sondern an einen anderen Trabanten erfolgt, sind die Koordinaten dieses Trabanten zunächst nach dem System seiner Bahnebene zu berechnen und dann auf das der Berechnung der Koordinaten von Hyperion zugrunde gelegte System zu transformieren. Zur Bestimmung der rechtwinkligen Koordinaten dienen alsdann die folgenden Formeln:

$$\begin{aligned} x &= r \nu \sin (u - U) \\ y &= r \nu \sin B \cos (u - U), \end{aligned}$$

worin

$$\begin{aligned} \nu &= \frac{a(\varrho)}{\varrho} \frac{1}{1 + \zeta} \\ \zeta &= \frac{a(\varrho)}{\varrho} r \cos B \cos (u - U) \sin 1''. \end{aligned}$$

In diesen Formeln bezeichnet *r* den Radiusvektor der Trabantenbahn, ausgedrückt in Einheiten der großen Halbachse *a* in der mittleren Entfernung (*ϱ*) des Saturn von der Erde ($\log(\varrho) = 0.97950$). *ϱ* ist die geozentrische Distanz des Saturn, *U* und *B* seine Länge und Breite bezogen auf die Bahnebene des Trabanten als Fundamentalebene, *u* ist die wahre Länge des Trabanten in seiner Bahn, gezählt vom aufsteigenden Knoten per Bahn auf dem Erdäquator. Die Umwandlung von Positionswinkel *p*

und Distanz s in rechtwinklige Koordinaten geschieht mit Hülfe der Formeln:

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 &= s \sin (p - P) \\y_1 - y_2 &= s \cos (p - P),\end{aligned}$$

wobei der Index 1 sich auf Hyperion, der Index 2 auf den Anschlußtrabanten bezieht. Erfolgt der Anschluß an den Planeten, so ist natürlich $x_2 = 0$, $y_2 = 0$ zu setzen.

Da Positionswinkel und Distanz im allgemeinen nicht in demselben Zeitmoment beobachtet sind, so muß an eine der Koordinaten eine Reduktion „wegen Zeitdifferenz“ angebracht werden. Diese ist mit Hülfe der Differentialquotienten von x und y nach der mittleren Länge leicht zu finden. Durchweg sind die Beobachtungszeiten der Positionswinkel beibehalten worden, und demzufolge wurde die Korrektur wegen Zeitdifferenz an die Distanz angebracht.

Ausgangselemente.

(Str. pg. 290).

Epoche: 1890 Januar 0, mittl. Zt. Gr.

$$l = E_0 + \delta l + n t$$

$$E_0 = 304.53 \text{ (Ekl.)}$$

$$n = 16.919983 \text{ (trop.)}$$

$$\delta l = r \sin \frac{360^\circ}{T} (\tau - \tau_0)$$

$$\delta n = r \sin \frac{360^\circ}{T} \cos \frac{360^\circ}{T} (\tau - \tau_0)$$

$$r = 9.16 \quad T = 640.5^d \quad \tau_0 = 1889 \text{ Januar } 8.2$$

Äquinoktium 1890.0

Epoche 1890.0 + t

$$\begin{aligned}\Omega &= 167^\circ 49.7 + 42.4 \sin (47.8 - 0.50 t) + 78.1 \sin (121.7 - 2.0 t) \\i &= 27^\circ 20.8 + 19.6 \cos (47.8 - 0.50 t) + 36.2 \cos (121.7 - 2.0 t) \quad \left. \vphantom{\begin{aligned}\Omega &= \\i &= \end{aligned}} \right\} \text{ (Ekl.)}\end{aligned}$$

Epoche und Äquinoktium 1888.890 + t

$$\begin{aligned}H &= 276.50 - 18.663 t + 14.0 \sin (H_1 - H_0) - 1.5 \sin 2 (H_1 - H_0) \\e &= 0.1043 + 0.0230 \cos (H_1 - H_0) + \delta e\end{aligned}$$

$$H_1 - H_0 = -0.84 + 19.191 t$$

$$e \delta e = -\frac{1}{12} \frac{\delta n}{n}$$

$$a = a_0 + \delta a$$

$$a_0 = 213.92''$$

$$\delta a = -\frac{2}{3} \frac{\delta n}{n} a$$

Die Formel zur Berechnung von II gilt nur für das Datum einer Opposition zwischen Hyperion und Titan. Für ein beliebiges Datum ist sie deshalb nicht anzuwenden, weil die Störung der Apsidenlinie Hyperions durch Titan hauptsächlich in der Zeit kurz vor und kurz nach der Konjunktion der beiden Trabanten erfolgt. Um den Betrag von II nun für jedes erforderliche Datum zu erhalten, wurde das Verfahren benutzt, welches auch H. Struve bei der Bearbeitung der Pulkowaer Beobachtungen angewandt hat. Es wurde für je einen synodischen Umlauf, d. h. für den Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Konjunktionen von Hyperion und Titan, der für die Oppositionszeit geltende Wert von II als Ausgangswert gewählt und dann durch Berücksichtigung der von Struve als synodische Störungen der Länge und des Radiusvektors bezeichneten und (Str. pg. 270) tabulierten Werte für die jedesmalige Beobachtungszeit verbessert. Oppositionen fanden statt:

1901		1902		1903		1904	
April	4	Juni	22	Juli	12	Juli	25
Juni	8	August	25	September	13	September	28
August	11	Oktober	28	November	15	Dezember	1
Oktober	14						

Vom Jahre 1902 ab gibt die *Connaissance des Temps* die zur bequemen Berechnung der Koordinaten notwendigen Hilfsmittel mit den Struveschen Elementen, diese Daten konnten deswegen für den vorliegenden Zweck verwandt werden. Bloß die Berechnung der mittleren Länge von Hyperion wurde direkt durchgeführt, weil die Interpolation nur sehr mühselig auszuführen ist, während die direkte Berechnung wenig Mehrarbeit verursacht und genauere Resultate zu erhalten gestattet. Die Angaben der *Connaissance des Temps* wurden nur als beiläufige Kontrolle benutzt.

Für die Anschlußtrabanten Titan, Rhea und Tethys konnten von 1902 ab alle Daten der *Connaissance des Temps* Verwendung finden, für 1901 dagegen mußten die Rechnungen für Titan direkt durchgeführt werden.

Für Titan hat Struve *Astr. Nachr.* 3885—86 aus Beobachtungen am Königsberger 13-zölligen Refraktor eine Korrektur für die mittlere Länge hergeleitet, die in der *Connaissance des Temps* noch nicht angewandt werden konnte. Diese Korrektur beträgt im Maximum — 4.7 und würde die x etwas beeinflussen können, bleibt aber selbst im extremsten Fall so klein, daß für den vorliegenden Zweck ihre Vernachlässigung das Resultat nicht merkbar beeinflussen kann. Der Einfluß auf die y verschwindet vollständig. In demselben Aufsatz leitet Struve auch einen neuen Wert für die Länge von Tethys und ihre Libration ab. Hier beträgt die Korrektur der Länge + 21.0, die der Libration kommt nicht in Betracht, da für die Beobachtungszeit das Argument des sinus gerade durch 180° hindurchgeht. Von dem Einfluß der Längenkorrektur auf die rechtwinkligen Koordinaten gilt in gleicher Weise das oben für Titan Gesagte.

Die Zeitangaben der folgenden Tabelle beziehen sich auf mittlere Greenwicher Zeit, die Korrektion wegen Aberration ist bereits angebracht.

Danach stellen sich die berechneten Örter, denen zum Vergleich die beobachteten sowie die Differenzen im Sinne $B - R$ hinzugefügt sind, wie folgt:

Beobachtung—Rechnung.

I. Hyperion—Saturn 1901.

1901	Red. M. Zt. Gr.			R x_1	B x_1	$B-R$ x	R y_1	B y_1	$B-R$ y
	^h	^m	^s						
Juli 13	18	33	27	— 1.68	— 1.68	0.00	+95.05	+94.62	—0.43
18	18	58	26	+204.14	+204.46	+0.32	— 6.27	— 6.71	—0.44
19	18	24	46	+187.03	+187.43	+0.40	—35.27	—36.50	—1.23
Aug. 1	17	23	44	—135.62	—135.27	+0.35	+81.96	+84.40	+2.44
8	17	7	0	+201.33	+202.07	+0.74	+ 1.01	+ 0.85	—0.16
15	15	21	56	—143.56	—143.44	+0.12	—74.96	—77.30	—2.34
Sept. 4	15	21	14	— 71.43	— 71.87	—0.44	—86.59	—85.74	+0.85
13	14	20	36	—103.28	—103.03	+0.25	+84.00	+85.60	+1.60

II. Hyperion—Titan 1901.

1901	Red. M. Zt. Gr.			Hy x_1	Ti x_2	R $x_1 - x_2$	B $x_1 - x_2$	$B-R$ x	Hy y_1	Ti y_2	R $y_1 - y_2$	B $y_1 - y_2$	$B-R$ y
	^h	^m	^s										
Juli 13	18	21	6	— 2.38	+ 80.33	— 82.71	— 82.72	—0.01	+95.06	+66.90	+ 28.16	+ 28.58	+0.42
18	18	40	13	+204.23	+121.21	+ 83.02	+ 82.93	—0.09	— 5.88	—62.47	+ 56.59	+ 56.34	—0.25
19	18	11	12	+187.28	+ 60.64	+126.64	+126.55	—0.09	—35.00	—76.40	+ 41.40	+ 41.14	—0.26
26	17	12	46	—201.17	—125.73	— 75.44	— 75.55	—0.11	—53.48	+55.89	—109.37	—108.26	+1.11
Aug. 15	15	32	46	—143.95	+140.19	—284.14	—284.37	—0.23	—74.85	+45.20	—120.05	—120.12	—0.07
Sept. 4	15	29	26	— 71.78	+107.46	—179.24	—179.10	+0.14	—86.55	—63.04	— 23.51	— 23.36	+0.15
13	14	32	5	—102.84	— 49.88	— 52.96	— 53.61	—0.65	+84.08	+69.53	+14.55	+ 14.35	—0.20
18	14	38	0	+166.24	+170.67	— 4.43	— 4.47	—0.04	+42.56	—14.69	+ 57.25	+ 57.16	—0.09

III. Hyperion—Titan 1901.

1901	Red. M. Zt. Gr.			Hy x_1	Ti x_2	R $x_1 - x_2$	B $x_1 - x_2$	$B-R$ x	Hy y_1	Ti y_2	R $y_1 - y_2$	B $y_1 - y_2$	$B-R$ y
	^h	^m	^s										
April 28	19	29	14	+ 61.70	+167.32	—105.62	—106.29	—0.67	—77.24	—24.60	— 52.64	— 52.95	—0.31
29	18	51	28	+ 0.17	+136.67	—136.50	—137.48	—0.98	—83.27	—47.62	— 35.65	— 35.25	+0.40
Mai 13	18	48	14	+134.48	+178.70	— 44.22	— 43.62	+0.60	+62.78	+ 1.48	+ 61.30	+ 61.48	+0.18
14	19	10	50	+175.03	+170.22	+ 4.81	+ 4.90	+0.09	+40.20	—26.74	+ 66.94	+ 67.27	+0.33
15	18	49	27	+195.75	+136.97	+ 58.78	+ 58.98	+0.20	+13.88	—50.37	+ 64.25	+ 64.03	—0.22
23	18	40	51	—169.81	—140.18	— 29.63	— 30.71	—1.08	—62.85	+45.32	—108.17	—108.39	—0.22
Juni 9	17	32	52	+ 83.58	— 82.55	+166.13	+164.80	—1.33	—79.19	+65.73	—144.92	—146.52	—1.60
10	17	24	20	+ 18.37	— 11.26	+ 29.63	+ 29.06	—0.57	—88.27	+73.02	—161.29	—161.69	—0.40
18	17	1	50	—213.00	+ 9.83	—222.83	—222.54	+0.29	+48.19	—78.33	—126.52	—125.65	—0.87
24	16	19	56	+122.01	—139.44	+261.45	+262.05	+0.60	+73.66	+49.59	+ 24.07	+ 22.79	—1.28
27	16	13	12	+205.04	+ 66.79	+138.25	+138.41	+0.16	— 4.69	+68.76	— 73.45	— 74.49	—1.04
Juli 5	15	30	45	—202.90	— 63.95	—138.95	—139.26	—0.31	—52.46	—74.17	+ 21.71	+ 22.48	+0.77
9	15	7	50	—219.61	—175.42	— 44.19	— 43.81	+0.38	+45.01	+25.05	+ 19.96	+ 19.84	—0.12
10	14	27	13	—184.55	—138.14	— 46.41	— 46.22	+0.19	+65.39	+50.81	+14.58	+ 14.55	—0.03
15	14	37	38	+113.61	+172.64	— 59.03	— 59.13	—0.10	+76.80	+24.94	+51.86	+ 52.19	+0.33
21	14	23	7	+103.05	— 68.05	+171.10	+170.15	—0.95	—77.26	—73.88	— 3.38	— 3.74	—0.36
23	14	19	44	— 28.66	—169.04	+140.38	+139.57	—0.81	—92.45	—32.22	— 60.23	— 59.76	+0.47

1901	Red.			<i>Hy</i>	<i>Ti</i>	<i>R</i>	<i>B</i>	<i>B-R</i>	<i>Hy</i>	<i>Ti</i>	<i>R</i>	<i>B</i>	<i>B-R</i>
	M.	Zt.	Gr.	α_1	α_2	$\alpha_1 - \alpha_2$	$\alpha_1 - \alpha_2$	α	η_1	η_2	$\eta_1 - \eta_2$	$\eta_1 - \eta_2$	η
Aug.	7	14	8 58	+187.52	-131.11	+318.63	+317.72	-0.91	+34.42	-54.94	+ 89.36	+ 89.73	+0.37
	8	14	37 44	+201.29	-170.08	+371.37	+371.30	-0.07	+ 4.18	-28.87	+ 33.05	+ 33.99	+0.94
	9	13	50 15	+192.02	-182.57	+374.59	+374.46	-0.13	-25.00	0.00	- 25.00	- 24.74	-0.26
	19	13	30 56	-236.74	+118.55	-355.29	-355.03	+0.26	+12.85	-61.36	+ 74.21	+ 73.27	-0.94
	20	12	59 26	-222.18	+ 60.04	-282.22	-282.77	-0.55	+36.62	-75.18	+111.80	+110.02	-1.78
	21	13	8 14	-192.33	- 8.48	-183.85	-183.96	-0.11	+58.55	-78.69	+137.24	+136.97	-0.27
	22	13	52 19	-147.98	- 77.10	- 70.88	- 70.51	+0.37	+76.73	-70.60	+147.33	+145.27	-2.06
	3	12	34 11	- 0.34	+156.66	-157.00	-157.44	-0.44	-89.15	-88.73	- 50.42	- 51.03	-0.61
	4	12	47 9	- 64.84	+113.48	-178.32	-178.10	+0.22	-87.26	-61.07	- 26.19	- 26.46	-0.27
	6	12	49 43	-171.12	- 12.43	-158.69	-158.73	-0.04	-61.96	-77.04	+ 15.08	+ 14.75	-0.33
Sept.	7	12	25 5	-205.74	- 76.09	-129.65	-128.98	+0.67	-41.94	-69.08	+27.14	+27.77	+0.63
	8	11	19 28	-225.63	-127.76	- 97.87	- 98.21	-0.34	-19.80	-52.27	+32.47	+33.45	+0.98
	9	12	33 20	-231.37	-164.73	- 66.64	- 65.59	+1.05	+ 5.73	-25.96	+31.69	+32.07	+0.38
	12	11	2 33	-160.26	-119.24	- 41.02	- 39.61	+1.41	+69.01	+53.34	+ 15.67	+ 14.54	-1.13

IV. Hyperion—Titan 1902.

1902	Red.			<i>Hy</i>	<i>Ti</i>	<i>R</i>	<i>B</i>	<i>B-R</i>	<i>Hy</i>	<i>Ti</i>	<i>R</i>	<i>B</i>	<i>B-R</i>
	M.	Zt.	Gr.	α_1	α_2	$\alpha_1 - \alpha_2$	$\alpha_1 - \alpha_2$	α	η_1	η_2	$\eta_1 - \eta_2$	$\eta_1 - \eta_2$	η
June	14	20	56 23	-243.51	+118.04	-361.55	-362.31	-0.76	-10.54	+49.03	- 59.57	- 59.36	+0.21
Aug.	6	16	56 49	+203.12	+ 80.01	+123.11	+122.73	-0.38	+ 5.15	-67.74	+ 72.89	+ 73.45	+0.56
	6	18	19 47	+203.46	+ 76.26	+127.20	+126.23	-0.97	+ 3.52	-68.37	+ 71.89	+72.06	+0.17
	14	16	29 0	-168.29	+ 76.98	- 91.31	- 92.67	-1.36	-69.03	+63.33	-132.36	-132.15	+0.21
	14	16	46 40	-168.87	- 76.15	- 92.72	- 93.82	-1.10	-68.84	+63.47	-132.31	-131.39	+0.92
Sept.	3	15	22 19	-101.39	+168.87	-270.26	-274.16	-3.90	-83.13	+22.32	-105.45	-104.31	+1.14
	4	15	45 36	-154.14	+181.29	-335.43	-333.52	+1.91	-71.26	- 5.47	- 65.79	- 64.95	+0.84
	17	14	11 23	+185.99	+ 70.18	+115.81	+114.75	-1.06	+20.28	+61.27	- 40.99	- 40.66	+0.33
Okt.	1	14	25 37	-186.50	- 63.43	-123.07	-123.18	-0.11	+46.39	+61.79	- 15.40	- 15.43	-0.03
	2	14	25 38	-144.19	+ 5.05	-149.24	-150.36	-1.12	+62.96	+65.87	- 2.91	- 4.02	-1.11

V. Hyperion—Rhea 1902.

1902	Red.			<i>Hy</i>	<i>Rh</i>	<i>R</i>	<i>B</i>	<i>B-R</i>	<i>Hy</i>	<i>Rh</i>	<i>R</i>	<i>B</i>	<i>B-R</i>
	M.	Zt.	Gr.	α_1	α_2	$\alpha_1 - \alpha_2$	$\alpha_1 - \alpha_2$	α	η_1	η_2	$\eta_1 - \eta_2$	$\eta_1 - \eta_2$	η
June	14	20	42 ^m 0	-243.46	- 79.23	-164.23	-164.79	-0.56	-10.76	+ 2.61	- 13.37	- 12.46	+0.91
Aug.	6	17	4 27	+203.15	+ 16.42	+186.73	+186.97	+0.24	+ 5.00	-30.23	+ 35.23	+ 36.00	+0.77
	21	16	36 20	-126.35	- 77.20	- 49.15	- 48.09	+1.06	+72.96	+ 7.97	+64.99	+66.39	+1.40
	28	15	55 27	+196.89	+ 68.68	+128.21	+127.86	-0.35	-15.84	-15.75	- 0.09	- 0.90	-0.81
	3	15	53 54	-102.62	- 65.50	- 37.12	- 40.10	-2.98	-82.94	-15.14	- 67.80	- 66.88	+0.92
Sept.	4	15	32 39	-153.71	- 54.44	- 99.27	-101.79	-2.52	-71.39	+22.49	- 93.88	- 92.30	+1.58
	17	15	11 49	+186.76	- 76.40	+263.16	+263.26	+0.10	+19.15	+ 1.54	+17.61	+17.81	+0.20
	1	15	2 45	-185.58	- 60.46	-125.12	-125.97	-0.85	+46.87	+18.08	- 28.79	- 29.73	+0.94
Okt.	2	15	13 12	-142.60	+32.81	-175.41	-175.46	-0.05	+63.43	+25.76	+ 37.67	+38.71	+1.04

VI. Hyperion—Tethys 1903.

1903	Red.			<i>Hy</i>	<i>Te</i>	<i>R</i>	<i>B</i>	<i>B-R</i>	<i>Hy</i>	<i>Te</i>	<i>R</i>	<i>B</i>	<i>B-R</i>
	M.	Zt.	Gr.	α_1	α_2	$\alpha_1 - \alpha_2$	$\alpha_1 - \alpha_2$	α	η_1	η_2	$\eta_1 - \eta_2$	$\eta_1 - \eta_2$	η
Sept.	13	13	13 3	+187.43	+ 19.17	+168.26	+167.33	-0.93	+23.26	+13.15	+ 10.11	+ 10.62	+0.51
	14	12	16 41	+203.39	- 21.37	+224.76	+224.03	-0.73	+ 0.21	-12.71	+12.92	+13.83	+0.91
	15	12	23 26	+197.93	- 28.61	+169.32	+168.83	-0.49	-23.86	+10.68	-34.54	-33.97	+0.57
	22	12	2 7	-144.75	-39.90	-104.85	-104.34	+0.51	-68.17	+ 7.21	-75.38	-75.92	-0.54
	25	11	37 20	-230.81	+26.62	-257.43	-257.66	-0.23	-17.85	-12.75	- 5.10	- 5.37	-0.27
	26	11	40 37	-230.83	-19.51	-211.32	-212.50	-1.18	+ 2.87	+14.08	-11.21	-11.60	-0.39

VII. Hyperion—Titan 1903.

1903	Red. M. Zt. Gr.	<i>H</i> _γ <i>x</i> ₁	<i>T</i> _i <i>x</i> ₂	<i>R</i> <i>x</i> ₁ — <i>x</i> ₂	<i>B</i> <i>x</i> ₁ — <i>x</i> ₂	<i>B</i> — <i>R</i> <i>x</i>	<i>H</i> _γ <i>y</i> ₁	<i>T</i> _i <i>y</i> ₂	<i>R</i> <i>y</i> ₁ — <i>y</i> ₂	<i>B</i> <i>y</i> ₁ — <i>y</i> ₂	<i>B</i> — <i>R</i> <i>y</i>
	^h ^m ^s	[°]	[°]	[°]	[°]	[°]	[°]	[°]	[°]	[°]	[°]
Juli 24	17 22 37	—241.14	+ 41.66	—282.80	—283.57	—0.77	+ 3.88	—60.98	+ 64.86	+ 65.48	+ 0.62
Aug. 17	15 47 35	—150.41	— 27.35	—123.06	—123.95	—0.89	+54.65	+59.82	— 5.17	— 5.46	—0.29
Sept. 11	14 11 10	+ 95.06	— 41.37	+136.43	+133.39	—3.04	+59.78	—61.66	+121.44	+122.11	+ 0.67
	12 13 29 9	+149.68	—103.39	+253.07	+251.11	—1.96	+44.26	—51.44	+ 95.70	+ 96.44	+ 0.74
	13 12 57 23	+187.12	—151.13	+388.25	+386.75	—1.50	+23.50	—33.94	+ 57.44	+ 57.86	+ 0.42
	14 12 39 29	+203.50	—176.90	+380.40	+379.97	—0.43	— 0.17	—11.34	+ 11.17	+ 12.15	+ 0.98
	15 12 43 22	+197.72	—175.35	+373.07	+373.16	+0.09	—24.18	+13.29	— 37.47	— 37.04	+ 0.43
	21 12 9 24	— 94.49	+158.95	—253.44	—253.32	+0.12	—77.74	+27.24	—104.98	—105.00	—0.02
	22 12 30 0	—145.67	+180.78	—326.44	—325.40	+1.04	—67.95	+ 3.78	— 71.73	— 71.80	—0.07
	25 12 5 55	—230.99	+ 92.97	—323.96	—324.53	—0.57	—17.45	—55.38	+ 37.93	+ 37.36	—0.57
Okt. 13	11 16 33	—120.89	— 40.22	— 80.67	— 80.85	—0.18	—70.57	—59.24	—11.33	—10.87	+ 0.46
	14 11 7 12	—164.38	—100.28	— 64.10	— 63.99	+0.11	—58.82	—48.97	— 9.85	— 9.42	+ 0.43
	18 10 52 13	—214.54	—136.62	— 77.92	— 78.50	—0.58	+14.49	+34.89	—20.40	—20.35	+ 0.05
	20 10 32 22	—147.97	— 20.01	—127.96	—129.86	—1.90	+49.06	+57.02	— 7.96	— 8.32	—0.36
	21 40 47 36	— 92.79	+ 49.41	—142.20	—144.85	—2.65	+60.57	+54.48	+ 6.09	+ 5.22	—0.87

VIII. Hyperion—Titan 1904.

1904	Red. M. Zt. Gr.	<i>H</i> _γ <i>x</i> ₁	<i>T</i> _i <i>x</i> ₂	<i>R</i> <i>x</i> ₁ — <i>x</i> ₂	<i>B</i> <i>x</i> ₁ — <i>x</i> ₂	<i>B</i> — <i>R</i> <i>x</i>	<i>H</i> _γ <i>y</i> ₁	<i>T</i> _i <i>y</i> ₂	<i>R</i> <i>y</i> ₁ — <i>y</i> ₂	<i>B</i> <i>y</i> ₁ — <i>y</i> ₂	<i>B</i> — <i>R</i> <i>y</i>
	^h ^m ^s	[°]	[°]	[°]	[°]	[°]	[°]	[°]	[°]	[°]	[°]
Sept. 11	17 28 21	+219.27	+ 41.16	+178.11	+178.36	+0.25	— 7.01	—51.10	+ 44.09	+ 45.00	+ 0.91
	16 17 4 59	+ 29.96	—179.42	+209.38	+206.95	—2.43	—69.31	+ 9.31	— 78.62	— 78.70	—0.08
	17 15 41 10	— 26.19	—153.60	+127.41	+125.88	—1.53	—69.82	+27.00	— 96.82	— 96.94	—0.12
	27 14 16 15	— 34.47	+ 43.60	— 78.07	— 78.39	—0.32	+55.26	—50.86	+106.12	+106.20	+ 0.08
	29 14 38 51	+106.65	— 93.42	+200.07	+201.01	+0.94	+46.97	—43.43	+ 90.40	+ 90.78	+ 0.38
Okt. 1	16 57 8	+199.82	—175.84	+375.66	+376.90	+1.24	+14.74	— 9.36	+ 24.10	+ 23.18	—0.92
	13 14 4 24	—216.96	+ 38.40	—255.36	—256.34	—0.98	—17.12	—50.27	+ 33.15	+ 34.16	+ 1.01
	20 13 55 30	+ 91.52	— 93.01	+184.53	+186.14	+1.61	+47.70	+40.80	+ 6.90	+ 6.39	—0.51
	23 14 9 15	+204.41	+107.48	+ 96.93	+ 97.41	+0.48	+ 1.19	+37.30	— 36.11	— 36.97	—0.86
	27 13 32 39	+104.65	+145.37	— 40.72	— 43.17	—2.45	—58.10	—30.30	—27.80	—29.02	—1.22
	27 14 36 55	+102.47	+143.62	— 41.15	— 43.79	—2.64	—58.47	—30.25	—28.22	—28.09	+ 0.13
Nov. 3	13 38 50	—206.42	—166.22	— 40.20	— 40.90	—0.70	—19.40	+ 9.65	—29.05	—29.09	—0.04
	10 13 18 45	+ 79.71	+171.47	— 91.76	— 91.45	+0.31	+46.78	+ 4.39	+ 42.39	+ 42.54	+ 0.15
	11 13 43 18	+135.57	+167.79	— 32.22	— 31.40	+0.82	+36.15	—13.87	+ 50.02	+ 50.56	—0.54
	17 13 31 18	+111.75	—137.89	+249.64	+248.27	—1.37	—53.55	—25.51	—28.04	—28.33	—0.29
Dez. 2	12 50 38	+118.43	— 88.91	+207.34	+207.67	+0.33	+36.90	—36.89	+ 73.79	+ 73.64	—0.15

IX. Hyperion—Titan 1904.

1904	Red. M. Zt. Gr.	<i>H</i> _γ <i>x</i> ₁	<i>T</i> _i <i>x</i> ₂	<i>R</i> <i>x</i> ₁ — <i>x</i> ₂	<i>B</i> <i>x</i> ₁ — <i>x</i> ₂	<i>B</i> — <i>R</i> <i>x</i>	<i>H</i> _γ <i>y</i> ₁	<i>T</i> _i <i>y</i> ₂	<i>R</i> <i>y</i> ₁ — <i>y</i> ₂	<i>B</i> <i>y</i> ₁ — <i>y</i> ₂	<i>B</i> — <i>R</i> <i>y</i>
	^h ^m ^s	[°]	[°]	[°]	[°]	[°]	[°]	[°]	[°]	[°]	[°]
Aug. 12	15 58 12	—226.41	— 82.19	—144.22	—145.47	—1.25	+ 8.20	—44.13	+ 52.33	+ 53.23	+ 0.90
Sept. 2	13 51 53	—226.31	—113.40	—112.91	—113.07	—0.16	+ 6.17	+39.09	—32.92	—33.28	—0.36
	10 12 43 1	+204.17	+118.52	+ 85.65	+ 87.32	+1.67	+16.04	—41.89	+ 57.93	+ 57.90	—0.03
	11 12 27 52	+218.89	+ 55.71	+163.18	+163.16	—0.02	— 2.99	—50.22	+ 47.23	+ 46.72	—0.51
	16 14 26 41	+ 36.54	—180.79	+217.33	+216.11	—1.22	—68.98	+ 7.12	— 76.10	— 76.36	—0.26
	30 12 21 28	+156.94	—141.10	+298.04	+299.91	+1.87	+35.19	—31.14	+ 66.33	+ 66.54	+ 0.21
Okt. 1	12 1 17	+194.53	—172.54	+367.07	+369.00	+1.93	+18.53	—13.39	+ 31.92	+ 31.70	—0.22
	3 11 36 15	+208.59	—153.90	+362.49	+362.74	+0.25	—18.88	+25.24	—44.12	—44.48	—0.36
	4 12 30 41	+186.20	—102.73	+288.93	+287.50	—1.43	—36.54	+40.38	— 76.92	— 77.52	—0.60
	5 11 25 12	+150.86	— 38.37	+189.23	+188.14	—1.09	+50.30	+47.91	— 98.21	— 99.45	—1.24
	6 11 14 6	+103.76	+ 32.68	+ 71.08	+ 68.49	—2.59	—60.82	+48.02	—108.84	—109.87	—1.03
	7 11 51 30	+ 47.79	+101.25	— 53.46	— 56.12	—2.66	—67.34	+40.04	—107.38	—107.52	—0.14
	10 11 28 54	—118.33	+179.67	—298.00	—299.68	—1.68	—59.89	—11.34	— 48.55	— 48.59	—0.04

Die Abweichungen sind, wie man sieht, recht beträchtlich. Die Differenz $B - R$ übersteigt häufig den Betrag von 1" recht erheblich und beträgt jedenfalls viel mehr als die bei Struve nach der zweiten Auflösung übrigbleibenden Fehler (Str. pg. 272 ff.). Eine Erklärung hierfür bietet zunächst der Umstand, daß dort die übrigbleibenden Fehler bestimmt sind aus einem Elementensystem, welches gerade dem entsprechenden synodischen Umlauf angepaßt ist, während die Ausgangselemente hier aus der Vereinigung von 12 solchen Elementensystemen hervorgegangen sind, die z. T. nicht unerheblich voneinander abweichen. Das gilt besonders von den mittleren Längen. Auch die Beobachtungen, die meistens nur auf wenigen Einstellungen beruhen, mögen an der unbefriedigenden Übereinstimmung einen Teil der Schuld tragen. Doch läßt die Zeichenfolge der Abweichungen erkennen, daß diese zum größten Teil reell sind, daß also die mangelhafte Theorie von Hyperion die Ursache dieser Erscheinung ist.

Einen ungefähren Überblick, wieviel der Beobachtung, wieviel der Theorie zur Last fällt, erhält man durch Vergleichung der $B - R$ an solchen Tagen, wo zwei Beobachtungen stattgefunden haben. Daraus ergab sich als durchschnittliche Differenz der Beobachtungen

	in x	in y
1901	0.46	1.21 (Anschlüsse an Saturn)
1902	0.78 (mit Ausschluß von September 4)	0.73
1903	0.43	0.21
1904	0.59	0.91 (verschiedene Beobachter, größere Zwischenzeiten).

Ein bindender Schluß läßt sich der geringen Anzahl der Beobachtungen wegen aus diesem Resultat nicht ziehen. Es wird hierdurch jedoch die Inhomogenität in den verschiedenen Jahren und die sehr variable Größe der Beobachtungsfehler, die später auch die Ausgleichung bestätigt, hinreichend illustriert.

C. Die Verbesserung der Elemente.

Um nun die Bedingungsgleichungen zur Verbesserung der Elemente aufstellen zu können, braucht man die Differentialquotienten der rechtwinkligen Koordinaten nach den Elementen. Ihre Berechnung geschieht mit Hilfe der folgenden Formeln:

$$\begin{aligned} \frac{\partial x}{\partial E} &= \frac{v}{\sqrt{1-e^2}} \left\{ \cos(u - U) + e \cos(\Pi - N - U) \right\} \\ \frac{\partial x}{e \partial \Pi} &= - \frac{v}{\sqrt{1-e^2}} \left\{ \cos(\Pi - N - U) + \cos(u - U) [E] \right\} \\ \frac{\partial x}{\partial e} &= - \frac{v}{\sqrt{1-e^2}} \left\{ \sin(\Pi - N - U) \sqrt{1-e^2} - \cos(u - U) \sin E \right\} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial x}{\sin J \partial N} = -r \nu \operatorname{tg} \frac{J}{2} \cos(u - U)$$

$$\frac{\partial x}{\partial J} = 0$$

$$a \frac{\partial x}{\partial a} = x$$

$$\frac{\partial y}{\partial E} = -\frac{\nu}{\sqrt{1-e^2}} \sin B \left\{ \sin(u - U) + e \sin(\Pi - N - U) \right\}$$

$$\frac{\partial y}{e \partial \Pi} = -\frac{\nu}{\sqrt{1-e^2}} \sin B \left\{ \sin(\Pi - N - U) + \sin(u - U) [E] \right\}$$

$$\frac{\partial y}{\partial e} = -\frac{\nu}{\sqrt{1-e^2}} \sin B \left\{ \cos(\Pi - N - U) \sqrt{1-e^2} + \sin(u - U) \sin E \right\}$$

$$\frac{\partial y}{\sin J \partial N} = -r \nu \left\{ \cos B \cos u - \operatorname{tg} \frac{J}{2} \sin B \sin(u - U) \right\}$$

$$\frac{\partial y}{\partial J} = r \nu \cos B \sin u$$

$$a \frac{\partial y}{\partial a} = y.$$

Hierin bezeichnet:

E die mittlere Länge des Trabanten bezüglich des Äquators,
 Π die Länge des Perisaturniums, ebenfalls bezüglich des Äquators,
 e die Exzentrizität,
 N die Länge des aufsteigenden Knotens auf dem Äquator,
 J die Neigung gegen den Äquator,
 E die exzentrische Anomalie des Trabanten,

$$[E] = \sqrt{1-e^2} \cos E + \frac{\nu}{1 + \sqrt{1-e^2}}.$$

Lagen zwei Beobachtungen, wie das häufiger vorkam, nicht mehr als eine Stunde voneinander getrennt, so genügte es, die Koeffizienten der Bedingungsgleichungen nur einmal zu rechnen, und als absolutes Glied das Mittel der beiden $B - R$ zu nehmen. Dabei erhielt eine solche Bedingungsgleichung doppeltes Gewicht. Was im übrigen die Gewichtsverteilung anlangt, so wurde mangels zureichender Kriterien von einer Nuancierung abgesehen: nur einigen Gleichungen, die auffallend große Abweichungen — jedenfalls durch weniger sorgfältige Beobachtungen veranlaßt — zeigten, wurde, um die entstellende Wirkung abzuschwächen, das Gewicht $1/2$ verliehen.

Es wäre vielleicht nicht unberechtigt gewesen, solche Beobachtungen ganz auszuschließen. Da jedoch von vornherein nicht festzustellen war, ob Mängel der Theorie oder der Beobachtung die große Differenz verursachten, so wurden sie, wie bemerkt, mit dem Gewicht $1/2$ mitgenommen.

Die nachfolgende Zusammenstellung enthält außer den logarithmischen Koeffizienten der Bedingungsgleichungen, den numerischen Beträgen der absoluten Glieder und den den einzelnen Gleichungen zuerkannten Gewichten auch gleich die nach der Auflösung übrigbleibenden Fehler v , ebenfalls im Sinne $B - R$.

Koeffizienten der Bedingungsgleichungen in x . 1901.

1901	Beob- achter	dE	$ed\Pi$	de	$\sin JdN$	$\frac{da}{a}$	n	Gew.	v	
April	28	S	2.3137 _n	2.2187	2.5731 _n	0.9993	1.7903	-0.67	1	-0.14
	29	S	2.3345 _n	2.0570	2.6127 _n	1.0312	9.2304	0.98	1	-0.49
Mai	13	S	2.2059	1.7310 _n	2.5424 _n	0.9101 _n	2.1287	+0.60	1	+0.38
	14	S	2.0195	1.6647 _n	2.4453 _n	0.7194 _n	2.2431	+0.09	1	-0.04
Juni	15	S	1.5492	0.6882	2.3531 _n	0.2715 _n	2.2917	+0.20	1	+0.22
	23	S	2.1800 _n	1.4585 _n	2.5306 _n	0.9043	2.2299 _n	-1.08	1	-0.87
	9	S	2.3204 _n	2.2585	2.5777 _n	1.0030	1.9221	-1.33	1	0.77
	10	S	2.3559 _n	2.1271	2.6300 _n	1.0498	1.2641	-0.57	1	-0.04
	18	S	2.0155	2.1505	2.4016 _n	0.7824 _n	2.3284 _n	+0.29	1	+0.26
Juli	24	S	2.2592	1.6887 _n	2.5848 _n	0.9658 _n	2.0864	+0.60	1	+0.35
	27	S	1.2493 _n	1.7763	2.3392 _n	9.8115	2.3118	+0.16	1	+0.31
	5	S	2.0897 _n	1.4567 _n	2.4880 _n	0.8160	2.3073 _n	0.31	1	-0.15
	9	S	1.9792	2.1389	2.3922 _n	0.7494 _n	2.3416 _n	+0.38	(1)	+0.44
	10	S	2.1511	2.2173	2.4694 _n	0.9116 _n	2.2661 _n	+0.19	(1)	+0.21
	13	H	2.3451	1.8273	2.6166 _n	1.0740 _n	0.3075 _n	0.00	2	-0.21
	15	S	2.2750	1.5998 _n	2.5971 _n	0.9839 _n	2.0555	-0.10	1	-0.35
	18	H	1.2480 _n	1.7874	2.3378 _n	9.8023	2.3100	+0.11	2	+0.26
	19	H	1.9741 _n	2.1449	2.3723 _n	0.6287	2.2722	+0.15	2	+0.50
	21	S	2.3014 _n	2.2917	2.5520 _n	0.9785	2.0130	-0.95	1	-0.39
Aug.	23	S	2.3572 _n	1.9853	2.6124 _n	1.0574	1.4573 _n	-0.81	1	-0.32
	26	H	2.0927 _n	1.4176 _n	2.1880 _n	0.8182	2.3036 _n	-0.11	1	+0.05
	1	H	2.2525	2.2178	2.5441 _n	1.0019 _n	2.1323 _n	+0.35	1	+0.25
	7	S	1.9232	1.4675 _n	2.4215 _n	0.6260 _n	2.2780	-0.91	1	-0.99
	8	S	0.8071	1.5651	2.3398 _n	9.7077 _n	2.3038	-0.07	1	+0.02
	8	H	0.2558 _n	1.6535	2.3356 _n	9.0848 _n	2.3039	+0.74	1	+0.85
	9	S	1.8422 _n	2.0620	2.3439 _n	0.4878	2.2833	-0.13	1	+0.15
	15	H	2.2443 _n	0.9285 _n	2.5722 _n	0.9646	2.1576 _n	-0.05	2	+0.23
	19	S	1.3592	1.8605	2.3238 _n	0.1881 _n	2.3742 _n	+0.26	1	-0.01
	20	S	1.8702	2.0798	2.3543 _n	0.6481 _n	2.3468 _n	-0.55	1	-0.56
Sept.	21	S	2.0876	2.1898	2.4262 _n	0.8529 _n	2.2841 _n	-0.11	1	-0.15
	22	S	2.2150	2.2155	2.5106 _n	0.9707 _n	2.1702 _n	+0.37	1	+0.29
	3	S	2.3411 _n	2.0663	2.6186 _n	1.0364	9.5315 _n	-0.44	1	+0.06
	4	S	2.3193 _n	1.7145	2.6167 _n	1.0266	1.8118 _n	+0.22	1	+0.63
	4	H	2.3147 _n	1.6563	2.6142 _n	1.0231	1.8549 _n	-0.15	2	+0.25
	6	S	2.1521 _n	1.4112 _n	2.5092 _n	0.8769	2.2333 _n	-0.04	1	+0.16
	7	S	1.9808 _n	1.3273 _n	2.4280 _n	0.7071	2.3133 _n	+0.67	1	+0.79
	8	S	1.6688 _n	0.8575	2.3516 _n	0.3800	2.3533 _n	-0.34	1	-0.28
	9	S	0.9425	1.7421	2.3131 _n	9.8615 _n	2.3643 _n	+1.05	1	+1.07
	12	S	2.1653	2.1928	2.4721 _n	0.9241 _n	2.2048 _n	+1.41	(1)	+1.34
13	H	2.2622	2.1475	2.5553 _n	1.0098 _n	2.0131 _n	-0.20	(2)	-0.32	
18	H	2.0223	1.6884 _n	2.4372 _n	0.7203 _n	2.2207	-0.04	1	-0.18	

Koeffizienten der Bedingungsgleichungen in y . 1901.

1901	Beob- achter	dE	$ed\Pi$	de	$\sin JdN$	dJ	$\frac{da}{a}$	n	Gew.	v	
April	28	S	1.5191 _n	1.9935	0.5403 _n	2.1726 _n	2.0246 _n	1.8878 _n	-0.31	1	-0.16
	29	S	0.8352 _n	1.9230	1.2627	2.2551 _n	1.7508 _n	1.9205 _n	+0.40	1	+0.51
Mai	13	S	1.8100 _n	2.0779	1.8140	2.2457	1.8576 _n	1.7979	+0.18	1	+0.31
	14	S	1.9228 _n	2.1734	1.8107	2.1470	2.0901 _n	1.6023	+0.33	1	+0.51
	15	S	1.9741 _n	2.2334	1.6744	1.9570	2.2030 _n	1.1424	-0.22	1	0.00
	23	S	1.7672	2.0789	1.8663	2.2692 _n	2.0122	1.7983 _n	-0.22	1	-0.12
Juni	9	S	1.6475 _n	2.0582	1.0172 _n	2.1436 _n	2.1118 _n	1.8987 _n	-1.60	1	-1.43
	10	S	1.1893 _n	1.9695	1.0297	2.2528 _n	1.9086 _n	1.9458 _n	-0.40	1	-0.27
	18	S	1.8651	2.2148	0.8888 _n	1.4574	2.3396	1.6829	-0.87	1	-0.76
	24	S	1.7852 _n	2.0722	1.8157	2.2845	1.6804 _n	1.8673	-1.28	1	-1.15
	27	S	2.0068 _n	2.2742	1.4914	1.7741	2.2508 _n	0.6712 _n	-1.04	1	-0.79

1901	Beob- achter	dE	edH	de	$\sin JdN$	dJ	$\frac{da}{a}$	n	Gew.	v
Juli	5 S	1.8566	2.1548	1.8924	2.2499 _n	2.1168	1.7198 _n	+0.77	1	+0.88
	9 S	1.8830	2.2298	0.5123 _n	1.1100	2.3451	1.6533	-0.12	(1)	0.00
	10 S	1.8042	2.1779	1.2415 _n	1.8201	2.3192	1.8155	-0.03	(1)	+0.07
	13 H	0.8392 _n	1.9663	1.2601	2.2795	1.9026	1.9780	0.00	2	+0.08
	15 S	1.7594 _n	2.0592	1.8098	2.2929	1.4997 _n	1.8854	+0.33	1	+0.46
	18 H	2.0124 _n	2.2790	1.5175	1.8098	2.2444 _n	0.7835 _n	-0.34	2	-0.09
	19 H	1.9789 _n	2.2592	0.6252	9.6534	2.2684 _n	1.5457 _n	-0.74	2	-0.49
	21 S	1.7422 _n	2.1075	1.1093 _n	2.0594 _n	2.1769 _n	1.8880 _n	-0.36	1	-0.18
	23 S	0.5675	1.9543	1.5038	2.2870 _n	1.7235 _n	1.9659 _n	+0.47	1	+0.58
	26 H	1.8563	2.1530	1.9022	2.2568 _n	2.0912	1.7282 _n	+1.11	1	+1.22
Aug.	1 H	1.6594	2.1036	1.2797 _n	2.0412	2.2601	1.9136	+2.44	1/2	+2.53
	7 S	1.9778 _n	2.2248	1.8264	2.1446	2.1007 _n	1.5368	+0.37	1	+0.59
	8 S	2.0105 _n	2.2730	1.6304	1.9337	2.2129 _n	0.6212	+0.94	1	+1.19
	8 H	2.0117 _n	2.2747	1.5978	1.9016	2.2201 _n	0.0043	-0.16	1	+0.09
	9 S	1.9935 _n	2.2687	1.1281	1.4059	2.2566 _n	1.3979 _n	+0.26	1	+0.51
	15 H	1.7059	2.0454	1.8751	2.3049 _n	1.7267	1.8745 _n	-1.20	3/2	-1.11
	19 S	1.9262	2.2529	1.4644	1.8382 _n	2.3143	1.1089	-0.94	1	-0.81
	20 S	1.8964	2.2377	0.7344	1.2408 _n	2.3323	1.5637	-1.78	1	-1.66
	21 S	1.8304	2.1936	1.1016 _n	1.5627	2.3213	1.7675	-0.27	1	-0.16
	22 S	1.7073	2.1225	1.2923 _n	1.9492	2.2765	1.8850	-2.06	1/2	-1.97
Sept.	3 S	0.8906 _n	1.9535	1.2926	2.2348 _n	1.8902 _n	1.9501 _n	-0.61	1	-0.50
	4 S	1.2976	1.9490	1.6736	2.2870 _n	1.3640 _n	1.9408 _n	-0.27	1	-0.18
	4 H	1.3535	1.9533	1.6977	2.2899 _n	1.2335 _n	1.9373 _n	+0.50	2	+0.59
	6 S	1.7908	2.0977	1.8870	2.2726 _n	1.9350	1.7921 _n	-0.33	1	-0.24
	7 S	1.8712	2.1712	1.4598	2.2116 _n	2.1205	1.6226 _n	+0.63	1	+0.74
	8 S	1.9092	2.2192	1.7564	2.1083 _n	2.2246	1.2967 _n	+0.98	1	+1.10
	9 S	1.9176	2.2420	1.5163	1.9113 _n	2.2899	0.7582	+0.38	1	+0.51
	12 S	1.7452	2.1373	1.3040 _n	1.8310	2.2838	1.8389	-1.13	(1)	-1.03
	13 H	1.5326	2.0457	1.2229 _n	2.0757	2.2032	1.9243	+0.70	(1)	+0.78
	18 H	1.9302 _n	2.1799	1.8181	2.1731	1.9889 _n	1.6290	-0.09	1	+0.10

Koeffizienten der Bedingungsgleichungen in x . 1902.

1902	Beob- achter	dE	$edII$	de	$\sin JdN$	$\frac{da}{a}$	n	Gew.	v
Juni 14	H	1.2410 _n	2.0228 _n	2.3015 _n	0.1682	2.3863 _n	-0.66	2	-0.19
Aug. 6	H	1.3724	1.9982 _n	2.3109 _n	9.8470 _n	2.3069	-0.07	2	+0.47
6	H	1.2758	1.9769 _n	2.3133 _n	9.6838 _n	2.3077	-0.97	1	-0.45
14	H	2.1890 _n	2.3375 _n	2.4529 _n	0.9645	2.2261 _n	-1.23	2	-0.55
21	H	2.2850	1.8169 _n	2.5914 _n	0.9873 _n	2.1010 _n	+1.06	1	+1.94
28	H	1.5594 _n	1.5736 _n	2.3575 _n	0.3203	2.2942	-0.35	1	-0.08
Sept. 3	H	2.2798 _n	2.2973 _n	2.5473 _n	1.0409	2.0048 _n	-3.44	1	-2.81
4	H	2.2022 _n	2.3194 _n	2.4677 _n	0.9738	2.1872 _n	-0.30	1	+0.33
17	H	1.8035	2.1215 _n	2.2939 _n	0.4193 _n	2.2693	-0.48	2	+0.21
Okt. 1	H	2.0747	1.4455 _n	2.4600 _n	0.7820 _n	2.2717 _n	-0.48	2	+0.04
2	H	2.2108	1.6773 _n	2.5345 _n	0.9155 _n	2.1608 _n	-0.58	2	+0.12

Koeffizienten der Bedingungsgleichungen in y . 1902.

1902	Beob- achter	dE	edH	de	$\sin JdN$	dJ	$\frac{da}{a}$	n	Gew.	v
Juni	14 H	1.8716	2.1801	1.7283 _n	1.7654 _n	2.3449	1.0185 _n	+0.56	2	+0.19
Aug.	6 H	1.9815 _n	2.2291	1.7584 _n	1.7090	2.2583 _n	0.7182	+0.66	2	+0.10
	6 H	1.9821 _n	2.2282	1.7705 _n	1.6761	2.2608 _n	0.5550	+0.17	1	-0.39
	14 H	1.7185	2.1211	0.5873 _n	2.2860 _n	2.0797	1.8384 _n	+0.56	2	+0.05
	21 H	1.6110	1.9320	1.9024 _n	2.1508	2.1711	1.8633	+1.40	1	+1.38
	28 H	1.9718 _n	2.2046	1.8588 _n	0.7648	2.2664 _n	1.1979 _n	-0.81	1	-1.36
Sept.	3 H	1.4682	2.0190	0.3270 _n	2.3239 _n	1.6952	1.9197 _n	+1.03	2	+0.57
	4 H	1.6321	2.1000	8.9382 _n	2.2906 _n	2.0116	1.8528 _n	+1.21	2	+0.72
	17 H	1.9561 _n	2.2199	1.5493 _n	1.9360	2.1942 _n	1.2997	+0.26	2	-0.27
Okt.	1 H	1.8004	2.0424	1.9639 _n	1.7943	2.2806	1.6631	+0.45	2	+0.33
	2 H	1.6868	1.9473	1.9333 _n	2.0375	2.2081	1.7965	-0.03	2	-0.07

Koeffizienten der Bedingungsgleichungen in x . 1903.

1903	Beob- achter	dE	$edII$	de	$\sin JdN$	$\frac{da}{a}$	n	Gew.	v
Juli 24	F	1.4517	2.2346 _n	2.1873 _n	9.6958 _n	2.3823 _n	—0.77	1	—0.07
Aug. 17	F	2.2676	2.3550 _n	2.4806 _n	0.9227 _n	2.1773 _n	—0.89	1	+0.36
Sept. 11	F	2.3346	2.5730 _n	2.2531 _n	0.9593 _n	1.9780	—3.94	1/2	—1.38
12	F	2.2207	2.5100 _n	2.0883 _n	0.8320 _n	2.1752	—1.96	1	—0.59
13	F	1.9904	2.3889 _n	2.0322 _n	0.5655 _n	2.2721	—1.21	2	—0.20
14	F	1.3814	2.2350 _n	2.1488 _n	9.0479 _n	2.3085	—0.58	2	+0.12
15	F	1.7101 _n	2.1241 _n	2.3135 _n	0.5461	2.2961	—0.20	2	+0.33
21	F	2.2671 _n	2.5398 _n	2.3266 _n	1.0689	1.9754 _n	+0.12	1	+1.06
22	F	2.2021 _n	2.5231 _n	2.1944 _n	1.0115	2.1634 _n	+0.77	2	+1.68
25	F	1.4865 _n	2.3017 _n	2.0401 _n	0.4362	2.3636 _n	—0.40	2	+0.26
26	F	1.3888	2.2136 _n	2.1638 _n	9.4972 _n	2.3633 _n	—1.18	1	—0.52
Okt. 13	F	2.2186 _n	2.5193 _n	2.2380 _n	1.0262	2.0824 _n	—0.18	(1)	+0.74
14	F	2.1310 _n	2.4844 _n	2.1032 _n	0.9489	2.2158 _n	+0.11	(1)	+0.95
18	F	1.7585	2.1975 _n	2.2141 _n	0.3143 _n	2.3315 _n	—0.58	1	+0.13
20	F	2.2099	2.3069 _n	2.4282 _n	0.8619 _n	2.1702 _n	—1.90	1	—0.79
21	F	2.3073	2.4247 _n	2.4591 _n	0.9558 _n	1.9675 _n	—2.65	1/2	—1.26

Koeffizienten der Bedingungsgleichungen in y . 1903.

1903	Beob- achter	dE	$edII$	de	$\sin JdN$	dJ	$\frac{da}{a}$	n	Gew.	v
Juli 24	F	1.8437	1.9254	2.0811 _n	1.1985	2.3565	0.5888	+0.62	1	+0.57
Aug. 17	F	1.6798	1.5144	2.0474 _n	2.1775	2.1480	1.7376	—0.29	1	—0.10
Sept. 11	F	1.6218 _n	1.9402	1.7158 _n	2.2188	1.9342 _n	1.7766	+0.67	1	+0.53
12	F	1.8032 _n	2.0416	1.8232 _n	2.0985	2.1394 _n	1.6460	+0.74	1	+0.48
13	F	1.8907 _n	2.0724	1.9565 _n	1.8489	2.2406 _n	1.3711	+0.46	2	+0.13
14	F	1.9176 _n	2.0323	2.0518 _n	0.8602	2.2803 _n	8.3010	+0.94	2	+0.60
15	F	1.8960 _n	1.9406	2.0910 _n	1.7619 _n	2.2708 _n	1.3834 _n	+0.50	2	+0.20
21	F	1.3741	1.8772	1.6814 _n	2.3304 _n	1.9072	1.8906 _n	—0.02	1	—0.36
22	F	1.5957	1.9637	1.7346 _n	2.2748 _n	2.1222	1.8322 _n	—0.30	2	—0.65
25	F	1.8376	2.0059	2.0268 _n	1.7492 _n	2.3330	1.2417 _n	—0.42	2	—0.60
26	F	1.8491	1.9413	2.0827 _n	0.2254 _n	2.3355	0.4579	—0.39	1	—0.46
Okt. 13	F	1.5067	1.9185	1.6894 _n	2.2882 _n	2.0356	1.8486 _n	+0.46	(1)	+0.12
14	F	1.6617	1.9834	1.7751 _n	2.2160 _n	2.1765	1.7695 _n	+0.43	(1)	+0.11
18	F	1.8280	1.8295	2.0974 _n	1.4780	2.3053	1.1611	+0.05	1	+0.07
20	F	1.6864	1.4941	2.0424 _n	2.0992	2.1522	1.6907	—0.36	1	—0.19
21	F	1.4793	1.4071	1.9464 _n	2.2009	1.9597	1.7823	—0.87	1	—0.70

Koeffizienten der Bedingungsgleichungen in x . 1904.

1904	Beob- achter	dE	$edII$	de	$\sin JdN$	$\frac{da}{a}$	n	Gew.	v
Aug. 12	Hm	1.7538	2.3592 _n	1.8969 _n	0.2089 _n	2.3542 _n	—1.25	1	—0.46
Sept. 2	Hm	1.6804	2.3544 _n	1.8088 _n	0.0686 _n	2.3542 _n	—0.16	1	+0.65
10	Hm	1.9379	2.4133 _n	0.9282	0.4783 _n	2.3093	+1.67	1	+0.97
11	Hm	1.1490	2.3406 _n	1.7347 _n	9.7488	2.3396	—0.02	1	—0.19
11	H	9.7642 _n	2.3345 _n	1.8380 _n	0.1181	2.3404	+0.25	1	+0.20
16	Hm	2.2971 _n	2.6170 _n	2.1085 _n	1.1089	1.5624	—1.22	1	+1.01
16	H	2.2989 _n	2.6202 _n	2.0885 _n	1.1110	1.4762	—2.43	1	—0.19
17	H	2.2993 _n	2.6333 _n	1.8323 _n	1.1138	1.4178 _n	—1.53	1	+0.75
27	H	2.3860	2.6376	2.0772 _n	1.0084 _n	1.5490 _n	—0.32	1	—0.84
29	H	2.3235	2.6047 _n	1.1550	0.9371 _n	2.0279	+0.94	1	—0.10
30	Hm	2.2081	2.5246 _n	1.5395	0.8114 _n	2.1957	+1.87	1	+0.86

1904	Beob- achter	dE	$edII$	de	$\sin JdN$	$\frac{da}{a}$	n	Gew.	r	
Okt.	1	Hm	1.9759	2.4170 _n	1.0503	0.5326 _n	2.2889	+1.93	1	+1.20
	1	H	1.9026	2.3958 _n	0.1252	0.4333 _n	2.3006	+1.24	1	+0.59
	3	Hm	1.6257 _n	2.3239 _n	2.0503 _n	0.5401	2.3191	+0.25	1	+0.60
	4	Hm	2.0018 _n	2.3858 _n	2.2188 _n	0.8266	2.2698	-1.43	1	-0.45
	5	Hm	2.1543 _n	2.4675 _n	2.2730 _n	0.9650	2.1783	-1.09	1	+0.40
	6	Hm	2.2385 _n	2.5424 _n	2.2522 _n	1.0474	2.0158	-2.59	1	-0.69
	7	Hm	2.2803 _n	2.5951 _n	2.1499 _n	1.0913	1.6790	-2.66	1	-0.51
	10	Hm	2.2198 _n	2.5808 _n	1.2379	1.0398	2.0727 _n	-1.68	1	+0.33
	13	H	1.5260 _n	2.3620 _n	0.9058	0.4955	2.3359 _n	-0.98	1	+0.18
	20	H	2.3258	2.6027 _n	0.5621	0.9403 _n	1.9608	+1.61	1	+0.62
	23	H	1.4483	2.3231 _n	1.6892 _n	9.3390 _n	2.3100	+0.48	1	+0.23
	27	H	2.2179 _n	2.5226 _n	2.2406 _n	1.0272	2.0195	-2.45	1	-0.65
	27	H	2.2206 _n	2.5255 _n	2.2382 _n	1.0299	2.0103	-2.64	1	-0.82
Nov.	3	H	1.6245 _n	2.3571 _n	1.4389	0.5523	2.3144 _n	-0.70	1	+0.44
	10	H	2.3217	2.5960 _n	0.6786	0.9365 _n	1.9007	+0.31	1	-0.65
	11	H	2.2175	2.5154 _n	1.6692	0.8250 _n	2.1314	+0.82	1	-0.20
	17	H	1.8866 _n	2.2052 _n	1.8832 _n	0.9988	2.0478	-1.37	1	-0.70
Dez.	2	H	2.2371	2.5259 _n	1.6803	0.8472 _n	2.0735	+0.33	1	-0.68

Koeffizienten der Bedingungsleichungen in y . 1904.

1904	Beob- achter	dE	$edII$	de	$\sin JdN$	dJ	$\frac{da}{a}$	n	Gew.	r
Aug. 12	Hm	1.7724	0.8362	2.0795 _n	1.9199	2.3115	0.9132	+0.90	1	+0.87
Sept. 2	Hm	1.7887	0.8763	2.0946 _n	1.8276	2.3191	0.7894	-0.36	1	-0.38
10	Hm	1.7946 _n	1.6829	2.0536 _n	1.0549	2.3072 _n	1.2043	-0.03	1	+0.42
11	Hm	1.8107 _n	1.5029	2.0898 _n	1.7446 _n	2.3086 _n	0.4755 _n	-0.51	1	+0.06
11	H	1.8085 _n	1.4452	2.0918 _n	1.7968 _n	2.3032 _n	0.8448 _n	+0.91	1	+1.49
16	Hm	1.0322 _n	0.6481	1.8152 _n	2.3764 _n	1.0788	1.8383 _n	-0.26	1	+0.14
16	H	0.9581 _n	0.7671	1.8095 _n	2.3746 _n	1.2645	1.8404 _n	-0.08	1	+0.31
17	H	0.7190	1.2742	1.7860 _n	2.3592 _n	1.8530	1.8437 _n	-0.12	1	+0.14
27	H	0.9941	0.2335	1.8146 _n	2.2764	0.2829 _n	1.7415	+0.08	1	+0.03
29	H	1.5526 _n	1.6736	1.8591 _n	2.1390	2.1145 _n	1.6718	+0.38	1	+0.52
30	Hm	1.7077 _n	1.7464	1.9556 _n	1.9331	2.2304 _n	1.5464	+0.21	1	+0.49
Okt. 1	Hm	1.7871 _n	1.7103	2.0400 _n	1.3692	2.2896 _n	1.2679	-0.22	1	+0.21
1	H	1.7957 _n	1.6888	2.0525 _n	1.2001	2.2955 _n	1.1686	-0.92	1	-0.46
3	Hm	1.7887 _n	1.2439	2.0833 _n	1.9841 _n	2.2661 _n	1.2758 _n	-0.36	1	+0.26
4	Hm	1.7270 _n	0.2167	2.0449 _n	2.1787 _n	2.1830 _n	1.5626 _n	-0.60	1	+0.03
5	Hm	1.6271 _n	0.7800 _n	1.9812 _n	2.2794 _n	2.0442 _n	1.7013 _n	-1.24	1	-0.65
6	Hm	1.4625 _n	0.7406 _n	1.9005 _n	2.3368 _n	1.7776 _n	1.7838 _n	-1.03	1	-0.51
7	Hm	1.1450 _n	0.4407	1.8227 _n	2.3606 _n	0.5123 _n	1.8279 _n	-0.14	1	+0.28
10	Hm	1.4665	1.6048	1.8506 _n	2.2499 _n	2.1708	1.7770 _n	-0.04	1	+0.10
13	H	1.7670	1.5014	2.0650 _n	1.3302 _n	2.3317	1.2329 _n	+1.01	1	+1.00
20	H	1.4922 _n	1.6341	1.8282 _n	2.1520	2.0614 _n	1.6778	-0.51	1	-0.40
23	H	1.7965 _n	1.5622	2.0684 _n	1.4611 _n	2.2855 _n	0.9763	-0.86	1	-0.33
27	H	1.4662 _n	0.7571 _n	1.8926 _n	2.3183 _n	1.7974 _n	1.7639 _n	-1.22	1	-0.72
27	H	1.4572 _n	0.7438 _n	1.8889 _n	2.3201 _n	1.7811 _n	1.7667 _n	+0.13	1	+0.63
Nov. 3	H	1.7454	1.4370	2.0463 _n	2.1204 _n	2.2135	1.2875 _n	-0.04	1	-0.06
10	H	1.4241 _n	1.5465	1.8057 _n	2.1517	2.0205 _n	1.6692	+0.15	1	+0.25
11	H	1.6398 _n	1.6651	1.9090 _n	1.9880	2.1781 _n	1.5573	-0.54	1	-0.30
17	H	1.1797 _n	1.0260 _n	1.8847 _n	2.2972 _n	1.8420 _n	1.7282 _n	-0.29	1	+0.11
Dez. 2	H	1.5713 _n	1.6120	1.8595 _n	2.0169	2.1409 _n	1.5670	-0.15	1	+0.03

Beobachter: F = Frederick, Hm = Hammond, H = Hussey, S = See.

Da, wie schon erwähnt, die Störungen von Titan auf Hyperion am größten um die Konjunktion herum sind, so liegt es nahe, die in diese Zeit fallenden Beobachtungen bei der Auflösung der Bedingungsgleichungen auszuschließen. Die Konjunktionen finden statt:

1901		1902		1903	1904
Mai	6	Juli	24	August 13	August 26
Juli	10	September 26		Oktober 15	Oktober 30
September 12					

Die Gleichungen, die danach bei der Auflösung nicht mitgenommen wurden, sind in der obigen Tabelle dadurch gekennzeichnet, daß ihr Gewicht eingeklammert ist.

Aus demselben Grunde wäre es zweckmäßig, immer nur die innerhalb eines synodischen Umlaufes liegenden Beobachtungen zusammenzufassen. Da aber deren Zahl eine verhältnismäßig geringe ist, empfahl es sich, größere Gruppen zu bilden, und es wurde daher eine Abscheidung vorgenommen in der Weise, daß die Gleichungen aus den Jahren 1901 und 1904 je für sich, aus den Jahren 1902 und 1903 aber, aus denen nur kleinere Reihen vorhanden sind, vereinigt aufgelöst wurden.

Die Normalgleichungen lauten alsdann, nachdem die Bedingungsgleichungen in der üblichen Weise homogen gemacht waren, folgendermaßen:

1901.

$$\begin{aligned}
 &+12.0999 (dE) - 3.0215 (edII) + 2.7185 (de) - 2.8180 (\sin JdN) + 4.3844 (dJ) + 0.5488 \left(\frac{da}{a}\right) = + 3.4484 \\
 &- 3.0215 \quad +16.6844 \quad - 3.3980 \quad - 1.0654 \quad - 1.4892 \quad - 0.7795 \quad = - 2.3252 \\
 &+ 2.7185 \quad - 3.3980 \quad +11.5141 \quad - 0.4639 \quad - 0.0678 \quad + 0.4861 \quad = + 1.7104 \\
 &- 2.8180 \quad - 1.0654 \quad - 0.4639 \quad +10.2989 \quad - 2.1080 \quad + 3.5102 \quad = - 0.0900 \\
 &+ 4.3844 \quad - 1.4892 \quad - 0.0678 \quad - 2.1080 \quad +11.0347 \quad + 0.9234 \quad = + 0.7150 \\
 &+ 0.5488 \quad - 0.7795 \quad + 0.4861 \quad + 3.5102 \quad + 0.9234 \quad +12.3481 \quad = - 0.0065
 \end{aligned}$$

1902—1903.

$$\begin{aligned}
 &+10.3491 (dE) - 0.2078 (edII) - 1.3879 (de) - 1.4117 (\sin JdN) + 5.0710 (dJ) + 0.7111 \left(\frac{da}{a}\right) = - 1.4185 \\
 &- 0.2078 \quad +11.3283 \quad +4.5838 \quad - 0.6316 \quad + 0.3506 \quad + 1.5698 \quad = + 5.1325 \\
 &- 1.3879 \quad + 4.5838 \quad +8.2888 \quad -0.4431 \quad - 0.5788 \quad + 2.3284 \quad = + 3.1647 \\
 &- 1.4117 \quad - 0.6316 \quad -0.4431 \quad +5.6960 \quad - 1.7437 \quad + 2.0983 \quad = - 0.6316 \\
 &+ 5.0710 \quad + 0.3506 \quad -0.5788 \quad -1.7437 \quad +10.3284 \quad - 0.1891 \quad = - 0.3358 \\
 &+ 0.7111 \quad + 1.5698 \quad +2.3284 \quad +2.0983 \quad - 0.1891 \quad +12.7562 \quad = + 0.6222
 \end{aligned}$$

1904.

$$\begin{aligned}
 &+10.6518 (dE) + 0.2075 (edII) + 5.5094 (de) - 0.0801 (\sin JdN) + 3.4989 (dJ) + 0.9956 \left(\frac{da}{a}\right) = + 8.3040 \\
 &+ 0.2075 \quad +18.6788 \quad + 6.1229 \quad - 0.0410 \quad - 0.7878 \quad - 5.6144 \quad = + 4.8254 \\
 &+ 5.5094 \quad + 6.1229 \quad +13.2795 \quad + 2.4480 \quad + 3.8245 \quad - 2.3461 \quad = + 7.0211 \\
 &- 0.0801 \quad - 0.0410 \quad + 2.4480 \quad +11.5451 \quad + 0.2186 \quad + 3.1203 \quad = + 1.1757 \\
 &+ 3.4989 \quad - 0.7878 \quad + 3.8245 \quad + 0.2186 \quad +13.3571 \quad - 0.5025 \quad = + 2.0988 \\
 &+ 0.9956 \quad - 5.6144 \quad - 2.3461 \quad + 3.1203 \quad - 0.5025 \quad +11.9286 \quad = + 1.8818
 \end{aligned}$$

Die Auflösung nach der Methode der kleinsten Quadrate ergibt die folgenden Korrekturen der Elemente mit den beigesetzten mittleren Fehlern:

Auflösung 1901.

Epoche: 1901 Juni 8.0 M. Zt. Gr.

$\log(dE)$	$= 9.4327$	dE	$= + 5.3$	± 2.5	$E = 46^{\circ} 43.7$	Anzahl der Gleichungen	74
$\log(edII)$	$= 9.1566_n$	dII	$= - 0.60$	± 0.42	$II = 28.37$	Summe der Gewichte	$82\frac{1}{2}$
$\log(de)$	$= 8.6597$	de	$= + 0.00013$	± 0.00034	$e = 0.08851$	$[nn]$	36.66
$\log(\sin JdN)$	$= 8.7381$	$\sin JdN$	$= + 1.2$	± 2.9	$N = 127^{\circ} 59.4$	$[vr]_x$	7.97
$\log(dJ)$	$= 8.6855_n$	dJ	$= - 1.1$	± 3.0	$J = 5^{\circ} 57.0$	$[vv]_y$	24.11
$\log\left(\frac{da}{a}\right)$	$= 8.5483_n$	da	$= - 0.042$	± 0.141	$a = 213.213$	$[vv]$	32.08

Mittlerer Fehler einer Gleichung: ± 0.687

Auflösung 1902—1903.

Epoche: 1902 Oktober 28.0 M. Zt. Gr.

$\log(dE)$	$= 9.1005_n$	dE	$= - 5.4$	± 4.4	$E = 332^{\circ} 59.1$	Anzahl der Gleichungen	50
$\log(edII)$	$= 9.5893$	dII	$= + 1.74$	± 0.43	$II = 2.32$	Summe der Gewichte	73
$\log(de)$	$= 9.1565$	de	$= + 0.00090$	± 0.00073	$e = 0.10084$	$[nn]$	61.40
$\log(\sin JdN)$	$= 8.9203_n$	$\sin JdN$	$= - 2.9$	± 4.4	$N = 127^{\circ} 44.7$	$[vr]_x$	24.54
$\log(dJ)$	$= 8.0039$	dJ	$= + 0.3$	± 3.5	$J = 5^{\circ} 59.0$	$[vv]_y$	10.19
$\log\left(\frac{da}{a}\right)$	$= 7.6365_n$	da	$= - 0.009$	± 0.182	$a = 213.408$	$[vv]$	34.73

Mittlerer Fehler einer Gleichung: ± 0.888

Auflösung 1904.

Epoche: 1904 September 28.0 M. Zt. Gr.

$\log(dE)$	$= 9.8239$	dE	$= + 22.9$	± 3.0	$E = 319^{\circ} 36.5$	Anzahl der Gleichungen	58
$\log(edII)$	$= 9.4247$	dII	$= + 0.85$	± 0.21	$II = 330.35$	Summe der Gewichte	58
$\log(de)$	$= 9.2788$	de	$= + 0.00239$	± 0.00112	$e = 0.11567$	$[nn]$	72.56
$\log(\sin JdN)$	$= 7.5119_n$	$\sin JdN$	$= - 0.1$	± 2.8	$N = 128^{\circ} 34.3$	$[vr]_x$	11.18
$\log(dJ)$	$= 8.6651_n$	dJ	$= - 1.9$	± 2.9	$J = 5^{\circ} 58.3$	$[vv]_y$	7.44
$\log\left(\frac{da}{a}\right)$	$= 9.4208$	da	$= + 0.564$	± 0.173	$a = 213.747$	$[vv]$	18.62

Mittlerer Fehler einer Gleichung: ± 0.605

Wie man sieht, vermindert sich in den Auflösungen für 1901 und 1902—1903 die Summe der Fehlerquadrate nur um einen geringen Betrag. 1901 liegt das offenbar daran, daß in diesem Jahre Anschlüsse von Hyperion an Saturn stattgefunden haben; denn die bei der geschilderten Beobachtungsweise unvermeidlichen Ungenauigkeiten in p machen sich hauptsächlich in den y -Koordinaten geltend und ein Ausschluß dieser Beobachtungen würde den Betrag von $[vv]_y$ bedeutend herabdrücken.

Bei der Auflösung der zweiten Gruppe von Beobachtungen hat vermutlich die Zusammenziehung der beiden Jahre 1902 und 1903 die geringe Verminderung der Fehlerquadratsumme im Gefolge.

Es darf auch nicht übersehen werden, daß die Korrekturen der Elemente mit einer viel größeren Genauigkeit bestimmt sind, als man nach den beigesetzten mittleren Fehlern voraussetzen sollte. Die letzteren mußten naturgemäß aus den übrigbleibenden Fehlern bestimmt werden. Natürlich bildet der mittlere Fehler aber nur dann einen zutreffenden Maßstab für die Genauigkeit, wenn die übrigbleibenden Fehler wirklich nur zufällige sind. Das ist aber, wie schon hervorgehoben wurde, nicht der Fall, hauptsächlich deshalb, weil die kurzperiodischen Störungen nicht in Rechnung gebracht werden können.

D. Folgerungen.

Aus der Auflösung geht hervor, daß die Ausgangselemente durch die vorliegenden Beobachtungen eine gute Bestätigung erfahren. Der Wert der Beobachtungen liegt aber, wie schon eingangs erwähnt, hauptsächlich darin, daß ihre Epoche von der der Pulkowaer Beobachtungen hinreichend weit entfernt ist, um eine genauere Bestimmung einiger der von Professor Struve abgeleiteten Konstanten zu unternehmen.

Was zunächst die Bahnlage betrifft, so müssen wir, um mit den bisherigen Daten vergleichen zu können, die auf den Äquator bezüglichen Korrekturen dN und dJ in $d\Omega$ und di , bezogen auf die Ekliptik, verwandeln. Dann wird:

	1901.5	1903.0	1904.8
$d\Omega$	+ 3.53	— 5.07	+ 2.51
di	— 0.03	— 1.68	— 1.46
$\Omega \left. \begin{array}{l} \\ i \end{array} \right\} 1890.0$	$169^\circ 38.7$ 27 29.8	$169^\circ 32.3$ 27 30.3	$169^\circ 39.7$ 27 32.9

Für die Bahnlage von Titan findet man:

$\Omega_{Ti} \left. \begin{array}{l} \\ i_{Ti} \end{array} \right\} 1890.0$	$168^\circ 15.4$ 27 40.9	$168^\circ 15.1$ 27 41.0	$168^\circ 14.8$ 27 41.2
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Folglich wird:

	1901.5	1903.0	1904.8
$(\Omega - \Omega_{Ti}) \sin i \left. \begin{array}{l} \\ i - i_{Ti} \end{array} \right\} 1890.0$	+ 38.5 — 11.1	+ 35.7 — 10.7	+ 39.3 — 8.3

Vereinigen wir diese Werte, indem wir jedem derselben die Summe der Gewichte der betreffenden Beobachtungsreihe beilegen (s. pg. 24), so erhalten wir für die Epoche 1902.9

	$(\Omega - \Omega_{Ti}) \sin i$	$i - i_{Ti}$
aus den Beobachtungen:	+ 37.8	— 10.2
Die berechneten Werte sind:	+ 37.2	— 8.8
Daraus folgt $B - R$:	+ 0.6	— 1.4

Das ist eine ganz gute Übereinstimmung. Die berechneten Werte sind abgeleitet mit Hülfe der Formeln (Str. pg. 285):

$$\sin i (\Omega - \Omega_{Ti}) = c \sin (b - ht) - \frac{1.25}{h} + \frac{4.12}{h - 0.50} \sin (47.8 - 0.50 t)$$

$$(i - i_{Ti}) = c \cos (b - ht) - \frac{15.29}{h} + \frac{4.12}{h - 0.50} \cos (47.8 - 0.50 t).$$

Hierin bedeutet t die Zeit, gerechnet von 1890.0 an, h ist eine Konstante, die von der Störungsfunktion von Titan auf Hyperion abhängt, deren Berechnung jedoch wegen der ungenügenden Konvergenz bei der Entwicklung der Störungsfunktion zu kompliziert ist, als daß sie mit Aussicht auf Erfolg unternommen werden könnte. Struve hat deshalb aus der Diskussion der Beobachtungen zwei Hypothesen für h aufgestellt, $h = 2^\circ$ und $h = 3^\circ$, und nach Feststellung der Übereinstimmung mit den Beobachtungen die erstere Hypothese beibehalten. Mit dieser sind die oben angeführten Werte erlangt. Die Konstanten b und c berechnen sich dann daraus, daß man für einen beliebigen Zeitpunkt die Beobachtungen genau darstellt. Struve wählte hierfür 1890.0, weil die Beobachtungen um diese Epoche den größten Anspruch auf Genauigkeit besitzen, und wir wollen sie bei den folgenden Betrachtungen festhalten.

Da die in der vorliegenden Arbeit verwerteten Beobachtungen einen genügend großen Abstand von dieser Epoche 1890.0 haben, so kann es unternommen werden, die Größe h genauer festzulegen. Es sind im folgenden die Werte $B - R$ zusammengestellt für die verschiedenen Beobachtungsepochen und die Hypothesen $h = 1.8, 1.9, 2.0$ usw. bis $h = 2.4$, außerdem noch für $h = 3.0$. In den zwischen 2.4 und 3.0 liegenden Werten, die für die Entscheidung nicht mehr in Betracht kommen, findet ein regelmäßiger Gang der Differenzen statt.

h	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	3.0
b	121.0	121.4	121.7	122.0	122.2	122.4	122.6	123.5
c	35.7	36.0	36.2	36.4	36.6	36.8	36.9	37.7
$(\Omega - \Omega_{Ti}) \sin i. \quad B - R.$								
1852.9	-6.4	-3.7	-1.1	+1.5	+4.0	+6.4	+8.8	+20.6
1878.5	-1.4	-0.6	+0.1	+0.9	+1.6	+2.3	+3.0	+ 7.6
1884.5	+3.0	+3.3	+3.6	+3.9	+4.2	+4.5	+4.8	+ 6.7
1890.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1902.9	+1.0	+0.8	+0.6	+0.4	+0.2	0.0	-0.2	-0.4
$i - i_{Ti}. \quad B - R.$								
1852.9	+4.1	+3.6	+2.9	+2.1	+1.0	-0.2	-1.5	-12.4
1878.5	-2.6	-2.1	-1.7	-1.2	-0.8	-0.4	-0.1	+ 1.8
1884.5	-0.9	-0.7	-0.4	-0.1	+0.2	+0.4	+0.7	+ 2.1
1890.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1902.9	+0.8	-0.4	-1.4	-2.1	-2.8	-3.6	-4.4	- 9.8

Danach ist es nun sicher, daß für h der Wert 3° nicht in Betracht kommen kann, vielmehr muß h ganz in der Nähe von 2° liegen. In $i - i_{Ti}$ ist die Darstellung am besten für $h = 2.1$, in $\Omega - \Omega_{Ti}$ aber, sowie, wenn man die Bestimmungen für beide Elemente der Bahnlage vereinigt, muß der Wert

$$h = 2.0 \pm 0.07$$

vorgezogen werden.

Was weiter die Elemente e und Π betrifft, so sind diese von dem Winkel abhängig, den die Apsidenlinien von Hyperion und Titan miteinander einschließen. Das folgt aus der Theorie und geht auch aus den Beobachtungen deutlich hervor. Struve hat diese beiden Elemente durch folgende trigonometrischen Reihen dargestellt:

$$\begin{aligned}\Pi &= \Pi_0 + a \sin (\Pi_1 - \Pi_0) + b \sin 2 (\Pi_1 - \Pi_0) \\ e &= e_0 + a' \cos (\Pi_1 - \Pi_0)\end{aligned}$$

Hierin ist

$$\begin{aligned}\Pi_0 &= 276.50 - 18.663 (t - t_0) & a &= +14.0 & b &= -1.5 & t_0 &= 1888.890 \\ e_0 &= 0.1043 & a' &= +0.0230\end{aligned}$$

Bei diesen Annahmen bleiben folgende Abweichungen in den einzelnen Bestimmungen übrig:

Epoche	Π_B	$\Pi_B - \Pi_R$	e_B	$e_B - e_R$	Gewicht
1849.00	296.73 :	+ 4.39 :	0.1261 :	+ 0.0060 :	1
1853.00	232.60	+ 0.55	0.1215	- 0.0026	1
1875.75	173.97	- 1.98	0.0974	- 0.0002	1
1877.84	133.33	+ 1.64	0.0872	+ 0.0022	1
1879.84	86.52	+ 2.75	0.0791	- 0.0023	1
1880.84	59.30	- 0.44	0.0816	- 0.0018	1
1884.00	351.34	- 2.23	0.1019	- 0.0005	1
1885.00	336.53	+ 0.25	0.1099	- 0.0002	1
1887.145	303.08	+ 0.50	0.1229	- 0.0004	2
1888.192	287.07	+ 0.26	0.1252	- 0.0014	2
1889.238	270.66	- 0.47	0.1261	- 0.0011	2
1890.107	258.29	+ 0.19	0.1256	+ 0.0001	2
1891.156	241.70	- 0.50	0.1221	+ 0.0009	2
1892.196	226.00	0.00	0.1174	+ 0.0025	2
1901.434	28.37	- 0.60	0.0885	+ 0.0001	2
1902.823	2.32	+ 1.74	0.1008	+ 0.0009	2
1904.740	330.35	+ 0.85	0.1157	+ 0.0024	2

Auf Grund der hinzugetretenen Bestimmungen habe ich es nun versucht, die Koeffizienten je eines weiteren Gliedes in der Entwicklung obiger trigonometrischer Reihen zu bestimmen und gleichzeitig die ursprünglichen Werte zu verbessern. Dabei ergab sich, daß ein vom Argument $\sin 3 (\Pi_1 - \Pi_0)$ abhängendes Glied keine nennenswerte Ver-

besserung in der Darstellung von Π ergab, daß dagegen ein Glied $+ b' \cos 2 (\Pi_1 - \Pi_0)$ in e mit einiger Sicherheit angegeben werden kann. Man findet die beste Darstellung durch folgende Werte der Koeffizienten, deren Genauigkeit aus den beigesetzten mittleren Fehlern zu ersehen ist:

$$\Pi_0 = 276.496 \pm 0.033$$

$$a = + 13.61 \pm 0.52$$

$$b = - 2.02 \pm 0.49$$

$$e_0 = 0.1045 \pm 0.0005$$

$$a' = + 0.0236 \pm 0.0007$$

$$b' = - 0.0015 \pm 0.0007$$

Die damit noch übrigbleibenden Abweichungen (im Sinne $B - R$) veranschaulicht die folgende Übersicht:

Epoche	in Π	in e
1849.00	+ 3.56	+ 0.0055
1853.00	+ 1.17	— 0.0028
1875.75	— 1.89	— 0.0017
1877.84	+ 1.41	+ 0.0029
1879.84	+ 2.85	— 0.0005
1880.84	— 0.16	— 0.0005
1884.00	— 2.53	— 0.0019
1885.00	— 0.39	— 0.0016
1887.145	— 0.23	— 0.0005
1888.192	— 0.11	— 0.0009
1889.238	— 0.35	— 0.0005
1890.107	+ 0.68	+ 0.0003
1891.156	+ 0.26	+ 0.0002
1892.196	— 0.75	+ 0.0009
1901.434	— 0.43	— 0.0001
1902.823	+ 1.41	— 0.0005
1904.740	+ 0.03	+ 0.0015

Es unterliegt keinem Zweifel, daß auch die mittleren Längen von dem Winkel $\Pi - \Pi_0$ abhängig sein werden. Die Bestimmung des Einflusses dieses Winkels ist aber, wie Struve bemerkt hat, großen Schwierigkeiten unterworfen, weil sich die bezüglichlichen Glieder mit den von der Libration abhängenden Gliedern kurzer Periode vermischen. Ein mit Hülfe der neuesten Beobachtungen unternommener Versuch, die Koeffizienten zu ermitteln, verlief ergebnislos. Die neuen Beobachtungen zeigen überdies, daß die Konstanten des von Struve bestimmten Hauptgliedes der Libration recht gut bekannt sind. Man wird sich zur Berechnung der mittleren Längen also vorläufig mit diesem Hauptglied begnügen müssen.

Somit werden nun die

Elemente von Hyperion.

$$l = E_0 + \delta l + n(t - 1890 \text{ Jan. } 0)$$

$$E_0 = 304.53 \text{ (Ekl.)}$$

$$\delta l = 9.16 \sin [0.56205 (\tau - 1889 \text{ Jan. } 8.2)]$$

$$n = 16.919983 \text{ (trop.)}$$

$$\left. \begin{aligned} \Omega &= 167^\circ 49.7 + 42.4 \sin (47.8 - 0.50 t) + 78.1 \sin (121.7 - 2.0 t) \\ i &= 27^\circ 20.8 + 19.6 \cos (47.8 - 0.50 t) + 36.2 \cos (121.7 - 2.0 t) \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Äquin.: } 1890.0 \\ \text{Epoche:} \\ 1890.0 + t \end{array}$$

$$\left. \begin{aligned} \Pi &= 276.50 - 18.663 t + 13.61 \sin (\Pi_1 - \Pi_0) - 2.02 \sin 2 (\Pi_1 - \Pi_0) \\ e &= 0.1045 + 0.0236 \cos (\Pi_1 - \Pi_0) - 0.0015 \cos 2 (\Pi_1 - \Pi_0) + \delta e \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Äquin. und} \\ \text{Epoche:} \\ 1888.890 + t \end{array}$$

$$\Pi_1 - \Pi_0 = -0.84 + 19.191 (t - 1888.890)$$

$$e \delta e = -0.00044 \cos [0.56205 (\tau - 1889 \text{ Jan. } 8.2)]$$

$$a = 213.92 + \delta a$$

$$\delta a = -0.757 \cos [0.56205 (\tau - 1889 \text{ Jan. } 8.2)]$$

Lebenslauf.

Ich, Rafael Richard Prager, jüdischer Religion, Sohn des Landrabbinen Dr. phil. Isaac Prager, wurde am 30. November 1883 in Hannover geboren. Meine Schulbildung erhielt ich auf dem Kgl. Friedrichs-Gymnasium zu Cassel, das ich Ostern 1901 mit dem Zeugnis der Reife verließ. Während des Sommersemesters 1901 besuchte ich die Universität Marburg, während des Sommersemesters 1903 die Universität Göttingen, die übrige Zeit meines Studiums verbrachte ich in Berlin. Ich studierte Mathematik und Naturwissenschaften, speziell Astronomie. Ich hörte die Vorlesungen der Herren: Ambronn, Bauschinger, v. Bezold, Blasius, Cohen, Dilthey, v. Drach, Fock, Foerster, Hellmann, Helmert, Hettner, Hilbert, Kekule von Stradonitz, Kirchner, Knoblauch, Kühnemann, E. Landau, Landolt, R. Lehmann, Less, v. Liszt, Marcuse, Meinardus, Minkowski, Nernst, Oldenberg, Paulsen, Peabody, Planck, Pringsheim, Ristenpart, Roethe, Scheiner, Schilling, E. Schmidt, Schmöle, Schottky, Schultz, Schwarz, Schwarzschild, Struve, Stumpf, v. Tuzek, Valentiner, Voigt, Wagner, Warburg, Wiechert, v. Wilamowitz-Moellendorff und beteiligte mich an den Seminarübungen bei Prof. Bauschinger, Foerster, Struve.

Seit dem 1. Januar 1908 bin ich als Hilfsarbeiter bei der Kommission für die Geschichte des Fixsternhimmels an der Kgl. Preußischen Akademie der Wissenschaften beschäftigt.

Die Promotionsprüfung habe ich am 20. Juli 1908 bestanden.

Allen meinen verehrten Lehrern spreche ich an dieser Stelle für die mir zuteil gewordene Anregung und Förderung meiner Studien meinen besten Dank aus.
